

Склад

*діюча речовина:* іхтаммол;

1 г мазі містить іхтаммолу 200 мг;

*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, гліцерин.

Лікарська форма

Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* густа однорідна маса чорно-коричневого кольору із специфічним запахом іхтіолу.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X.

Фармакологічні властивості

*Фармакодинаміка.*

Іхтіолова мазь чинить місцеву знеболювальну, протизапальну та антисептичну дію.

Показання

Опіки, екземи, бешихове запалення, невралгії, артрити.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів мазі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

При одночасному застосуванні з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбаченим ефектом. Тому не слід застосовувати препарат одночасно з іншими засобами для зовнішнього застосування.

Несумісний з розчинами йодистих солей, алкалоїдів, солей важких металів.

*Особливості застосування.*

Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот та на слизові оболонки.

Не можна допускати попадання мазі в очі та на слизові оболонки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінкам у період годування груддю не допускати потрапляння мазі на соски. Безпека та ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчались.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати зовнішньо. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу, прикриваючи пов'язкою. Тривалість курсу лікування зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.

Діти.

Досвіду застосування препарату для лікування дітей немає.

*Передозування.*

За умов дотримання рекомендацій передозування неможливе.

Побічні ефекти

Можливі місцеві або генералізовані прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, свербіж, печіння, почервоніння, подразнення шкіри, частіше на початку лікування або при тривалому застосуванні. При появі подразнення шкіри чи інших реакцій застосування мазі слід припинити.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 г у тубах № 1 або банках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.