

Склад

1 капсула (425мг) містить:

Пінен ( $\alpha+\beta$ )
Камфен
Цінеол
Фенхон
Борнеол
Анетол
Оливкова олія (Оливкова олія сорту Virgin)

Допоміжні речовини: желатин (капсула), гліцерин, таблеткове покриття E2, очищена вода.

Рекомендації щодо застосування

Комбінація натуральних біологічно активних речовин (терпенів, терпеноїдів, ароматичних ефірів) створює оптимальні умови для функціонування сечовидільної системи.

Уротінекс проявляє наступні властивості:

антилітогенна;

антибактеріальна;

протизапальна;

спазмолітична;

діуретична;

анальгетична дія.

Уротінекс сприяє дезінтеграції і виведенню ниркових каменів і каменів сечовивідного тракту. Терпени, такі як борнеол, зазнають метаболічних змін і виводяться із сечею, - в основному, у формі глюкуронідів, - що підвищує розчинність кальцієвих солей (основних компонентів каменів нирок і каменів сечовивідного тракту). У ряді експериментів на тваринах було встановлено інгібуючий ефект Уротінекса на формування ниркових каменів і каменів сечовивідного тракту.

Уротінекс має спазмолітичну дію, сприяє проходженню каменів по сечовивідних шляхах, зменшує біль при ниркових і сечоводо кольках, підсилює нирковий кровообіг, покращуючи їх функцію і підвищуючи

## ♥ Аптека інтернет це ♥

діурез. Він має протизапальну дію, протимікробну дію (по відношенню до цілого ряду грам-позитивних і грам негативних мікро), підвищує вміст захисних колоїдів в сечі і підвищує вміст глюкуронової кислоти в сечі

Тому Уротінекс може бути рекомендований при лікуванні:

сечокам'яної хвороби (нефролітіаз, уролітіаз);

для профілактики утворення каменів в нирках і сечовивідних шляхах.

Спосіб застосування та дози

Дорослі та діти старше 12 років приймають по 1-2 капсули 3 рази на добу. Для кращого засвоєння препарату капсули слід приймати перед прийомом їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Не розжовувати.

Термін вживання

Середній курс вживання 1-3 місяці. Можливість повторного курсу узгоджується з лікарем.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Діти віком до 12 років, вагітні та годуючі матері. Перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Капсули по 425мг, 10 капсул у блістері, 3 блістера в картонній коробці.

Дата виробництва та термін придатності, номер партії вказаний на упаковці.

Термін придатності

36 місяців.