

## Склад

*діючі речовини:* хлоралгідрат, камфора рацемічна;

1 мл препарату містить хлоралгідрату 333 мг, камфори рацемічної 333 мг;

*допоміжна речовина:* етанол 96 %.

## Лікарська форма

Розчин зубний.

*Основні фізико-хімічні властивості:* безбарвна прозора рідина з запахом камфори.

## Фармакотерапевтична група

Засоби для місцевого застосування у стоматології.

Код АТХ А01А D11.

## Фармакологічні властивості

*Фармакодинаміка.* Лікарський засіб чинить помірну знеболювальну та антисептичну дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

## Показання

Зубний біль при карієсі, в тому числі ускладненому пульпітом.

## Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до речовин, які входять до складу препарату, схильність до судомних нападів, бронхіальна астма.

Уникати контакту розчину з ушкодженою слизовою оболонкою.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Взаємодія поки що не відома.

## Особливості щодо застосування

При появі будь-якої небажаної реакції слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць застосування.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Оскільки лікарський засіб містить етанол, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

## ♥ Аптека інтернет це ♥

Препарат впливає на швидкість психомоторних реакцій, тому на період лікування слід уникати керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати дорослим.

Для усунення зубного болю ватний тампон, змочений 2–3 краплями препарату, закладати у каріозну порожнину зуба на 5–10 хв.

*Діти.*

Препарат не застосовувати для лікування дітей.

Передозування

При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти

*З боку нервової системи:* запаморочення, сонливість, головний біль, збудження, судоми.

*З боку дихальної системи, органів грудної клітки:* бронхоспазм.

*Алергічні реакції,* включаючи шкірні висипи, кропив'янку, свербіж, еритему.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 мл у флаконах в пачці або без пачки, або по 20 мл у флаконах-крапельницях в пачці або без пачки.

Категорія відпуску

Без рецепта.