

## ♥ Аптека інтернет це ♥

состав

(На 1 таблетку массой 1, 1 г): цитиколин - 250 мг, кальция фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, поливинилполипиролидон, магниевые соли жирных кислот, тальк, диоксид кремния.

Пищевая (питательная) ценность на 1 таблетку: белки - 0 г, жиры - 0 г, углеводы - 0,028 г энергетическая ценность (калорийность) на 1 таблетку: 0, 11 ккал.

Пищевая (питательная) ценность на 100 продукта: белки -0 г, жиры - 0 г, углеводы - 2,5 г; энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта: 10 ккал.

Рекомендации по применению

Аксобрекс может быть использован по рекомендации врача в качестве дополнительного источника биологически активных веществ в рацион питания взрослых, способствует:

- улучшению концентрации внимания;
- повышению интенсивности умственной деятельности;
- улучшению памяти в условиях повышенного интеллектуального нагрузки;
- улучшению мозгового кровообращения.

Свойства цитиколина:

- способствует повышению уровня мозговой деятельности, снижению уровня амнезии, улучшению состояния при когнитивных, сенситивных и моторных расстройствах, наблюдавшихся при ишемии мозга
- помогает стимулировать биосинтез структурных фосфолипидов в мембране нейронов, способствует улучшению функций мембран, в том числе функционированию ионообменных насосов и нейрорецепторов;
- участвует в подавлении деятельности некоторых фосфолипаз, препятствуя остаточному высвобождению свободных радикалов, предупреждении повреждения мембранных систем и обеспечении сохранности защитной антиоксидантной системы;
- оказывает противоотечные свойства, оказывает положительное

## ♥ Аптека інтернет це ♥

влияние в уменьшении отека мозга, благодаря стабилизирующей действия на мембрану;

может стимулировать уменьшение объема поврежденной ткани, способствуя уменьшению риска гибели клеток, действуя на механизмы апоптоза, и помогает улучшать холинергическую передачу;

способствует функциональной реабилитации при острых нарушениях мозгового кровообращения, осуществляя положительное влияние на уменьшение ишемического повреждения тканей мозга

помогает сокращать продолжительность восстановительного периода и уменьшать интенсивность посттравматического синдрома при черепно-мозговых травмах.

Рекомендации по применению

взрослым по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды.

Продолжительность приема 15-30 дней, более длительное применение согласовать с врачом.

предостережение

индивидуальная непереносимость компонентов. Не применять вместе с препаратами, которые содержат Центрофеноксин. Не применять детям и женщинам во время беременности и кормления грудью. Превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.

условия хранения

хранить в упаковке производителя, в сухом помещении при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

срок годности

2 года.

форма выпуска

таблетки, 30 таблеток в картонной коробке (3 блистера по 10 таблеток).