АДАПТОЛ® (ADAPTOL)

MEBICARUM* N05B X05**
Олайнфарм

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

табл. 0,3 г, № 20 Мебикар 0,3 г

№ UA/2785/01/02 от 09.11.2005 до 09.11.2010

табл. 500 мг, № 20 Мебикар 500 мг

№ UA/2785/01/01 от 30.03.2010 до 30.03.2015

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

мебикар (2,4,6,8-тетраметил-2,4,6,8-тетра-азабицикло(3,3,0)октандион-3,7) обладает умеренной транквилизирующей (анксиолитической) активностью, устраняет или ослабляет беспокойство, тревогу, страх, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражительность. Транквилизирующий эффект препарата не сопровождается миорелаксацией и нарушением координации движений. На основании этого мебикар относят к дневным транквилизаторам. Снотворным эффектом не обладает, однако усиливает действие снотворных средств и улучшает сон при его нарушениях.
Адаптол обладает антиоксидантной активностью, поэтому действует как мембраностабилизатор, адаптоген и церебропротектор при оксидантном стрессе разного генеза. В нейромедиаторном профиле действия Адаптола присутствуют дофаминопозитивный компонент и особенности агониста-антагониста адренергической системы. Это обусловливает нормостенические свойства препарата. Адаптол облегчает никотиновую абстиненцию.
При пероральном приеме биодоступность составляет 77–80%. До 40% препарата связывается с эритроцитами. Остальная часть не связана с белками крови и содержится в плазме крови в свободном виде, в связи с чем препарат без препятствий распространяется в организме и проникает через мембраны. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 30 мин, высокий уровень сохраняется 3–4 ч, затем постепенно снижается. Препарат полностью выводится из организма с мочой в течение суток, не накапливается и не подвергается биохимическим воздействиям в организме.

ПОКАЗАНИЯ:

неврозы и неврозоподобные состояния, сопровождающиеся раздражительностью, эмоциональной лабильностью, тревогой и страхом; для улучшения переносимости нейролептиков и транквилизаторов с целью устранения вызванных ими соматовегетативных и неврологических побочных эффектов; кардиалгия различного генеза (не связанная с ИБС); облегчает течение соматовегетативных проявлений при предменструальном синдроме и менопаузе. Адаптол показан как церебропротектор и адаптоген при эмоциональном и оксидантном стрессе различного генеза; в составе комплексной терапии никотиновой зависимости как средство, уменьшающее тягу к курению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Адаптол принимают внутрь независимо от приема пищи по 300–500 мг 2–3 раза в сутки. Максимальная доза на прием — 3 г, суточная — 10 г. Длительность курса лечения — от нескольких дней до 2–3 мес. Детям в возрасте 10–14 лет назначают индивидуально по 0,3–0,5 г 3 раза в сутки.
Для лечения при никотиновой зависимости препарат принимают по 600–900 мг 3 раза в сутки ежедневно в течение 5–6 нед.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

индивидуальная повышенная чувствительность к мебикару или к компонентам препарата. Детский возраст до 10 лет. Период беременности и кормления грудью.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

обычно препарат переносят хорошо.
Нарушения со стороны сердечно–сосудистой системы: снижение АД.
Нарушения со стороны ЖКТ: редко — диспептические нарушения. В таком случае необходимо снизить дозу

препарата.
Нарушения со стороны дыхательной системы: редко — бронхоспазм.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — после приема в высоких дозах возможны аллергические реакции (сыпь, зуд). В случае аллергической реакции прием препарата прекращают.
Общие нарушения: редко — гипотермия, слабость. При снижении АД и/или гипотермии (температура тела может снизиться на 1–1,5 °С) прием препарата прекращать не следует. АД и температура тела нормализуются самостоятельно.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Адаптол хорошо проникает во все ткани и жидкости организма. Нет достаточных данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому его не рекомендуют назначать беременным и кормящим грудью.
Влияния на способность управлять автотранспортными средствами не отмечено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Адаптол можно сочетать с нейролептиками, транквилизаторами (бензодиазепинами), снотворными, антидепрессантами и психостимуляторами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Адаптол малотоксичен. При значительной передозировке проводят общепринятые методы дезинтоксикации, включая промывание желудка.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

в сухом месте при температуре 15–25 °С.