

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
23.11.12 № 945
Регистрационное удостоверение
№ 26A/4415/02/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЭНТЕРОСГЕЛЬ
(ENTEROSGELUM)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 100 г пасты содержит гидрогель метилкремниевой кислоты 70 г
вспомогательное вещество: вода очищенная.

Лекарственная форма. Паста для перорального применения.
Однородная пастоподобная масса белого цвета, без запаха.

Название и местонахождение производителя. ПрАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ».
03680, г. Киев, ул. Радищева, 3.

Фармакотерапевтическая группа. Энтеросорбенты. Код АТС А07В С.

Энтеросгель – инертное кремний-органическое соединение. При применении обладает сорбционным действием. Препарат эффективно адсорбирует среднемолекулярные токсические вещества экзо- и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путем выводит их из организма.

Энтеросгель устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.

Обволакивая слизистую оболочку желудка и кишечника, Энтеросгель защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению локального иммунитета.

Энтеросгель не всасывается из кишечника и не претерпевает метаболических или химических превращений.

Показания к применению. В составе комплексной дезинтоксикационной терапии при хронической почечной недостаточности; при токсическом гепатите, вирусных гепатитах А, В, циррозе печени и холестазах различного генеза; при энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью; при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; при аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты); при ожоговой интоксикации; гнойно-септических и воспалительных процессах, которые сопровождаются интоксикацией; токсикозах беременных первой половины беременности, в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

Противопоказания. Острая кишечная непроходимость.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять при беременности и в период кормления грудью. Следует ограничить применение у беременных, склонных к развитию запоров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работ с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям с рождения. Детям в возрасте до 2 лет перед применением разовую дозу препарат смешивают с небольшим количеством воды.

Способ применения и дозы. Применять внутрь 3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после пищи или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Для взрослых и детей старше 14 лет разовая доза препарата составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза – 45 г.

Для детей с рождения до 5 лет: разовая доза препарата составляет 5 г (чайная ложка), суточная доза – 15 г; от 5 до 14 лет: разовая доза – 10 г (десертная ложка), суточная доза – 30 г.

Курс лечения – от 7 до 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний на протяжении первых трех суток возможно применение двойной разовой дозы, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более продолжительное (до 1 месяца) применение препарата.

Передозировка. Случаев передозировки препарата не описано. При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Побочные эффекты. При приеме препарата возможны диспепсические явления. В первые дни приема препарата возможно развитие запора. Для его предотвращения людям, склонным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактолоза, пикосульфат натрия).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Препарат может уменьшать действие других лекарственных средств, которые применяются вместе с ним. При условии соблюдения способа применения (Энтеросгель и лекарственные средства принимают с интервалом 1,5-2 часа), препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами, в том числе с пребиотиками и пробиотиками (бифидум-, лактобактерии), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномодуляторами. Не рекомендуется одновременный прием с препаратами, относящимися к классу секвестрантов желчных кислот, например холестирамином, вследствие усиления вероятности развития запоров.

Препарат не следует применять совместно с препаратами серебра.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С, не допускать замораживания. После замораживания теряет свои свойства. После вскрытия упаковки хранить при тех же самых условиях в плотно закрытой таре.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 135 г или 270 г или 405 г в контейнерах; по 15 г пакетах № 15 или № 30.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дося та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу