

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
12.02.09 № 83  
Регистрационное удостоверение  
№ UA/0758/01/01

**ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата**

**ГЛЮКОЗО - ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ**

**Состав.**

*действующее вещество:* глюкоза

1 пакет содержит порошка глюкозы 75,0 г;

*вспомогательное вещество:* кислота лимонная, моногидрат.

**Лекарственная форма.** Порошок дозированный по 75 г.

Гранулированный порошок белого или почти белого цвета, без запаха.

**Название и местонахождение производителя.**

ОАО “Фармак”.

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

**Фармакотерапевтическая группа.** Диагностические средства. Код АТС V04C A02.

**Показания к применению.** Пероральный Глюкозо-Толерантный Тест необходимо применять в случае, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или диабета.

**Противопоказания.** Нет.

**Особые предостережения.**

- Во время проведения пробы пациент должен спокойно лежать или сидеть, непосредственно перед проведением теста не следует курить, переохлаждаться и заниматься физической работой;
- тест не рекомендуется проводить после истощающих заболеваний, операций и родов, при воспалительных процессах, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях ЖКТ с нарушением всасывания глюкозы;
- перед проведением теста необходимо исключить прием лекарств (адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, мочегонных средств тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови;
- псевдопозитивные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.

**Применение в период беременности и кормления грудью.** Проведение перорального Глюкозо-Толерантного Теста в период беременности и кормления грудью не противопоказано.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Глюкозо-Толерантный Тест не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

**КОНТРОЛЬНЫЙ**

**Дети.** Тест можно проводить детям по показаниям без возрастных ограничений.

**Способ применения и дозы.** Пациент не должен уменьшать количество пищи на протяжении 3 дней до проведения теста. Непосредственно перед проведением теста пациент не должен принимать пищу в течение 10-16 ч. Тест проводится утром. Сначала определяется уровень глюкозы в крови натощак. После этого на протяжении 5 мин нужно выпить 75 г глюкозы, растворенной в 250 мл воды. При проведении пробы у тучных лиц глюкозу добавляют из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Через 2 ч определяется уровень глюкозы в крови.

**Дети.** После первого взятия крови из пальца обследуемый ребенок принимает внутрь водный раствор глюкозы в течение 5 минут из расчета - 1,75 г на 1 кг массы тела.

**Оценка результатов.** Оценить результаты теста можно по приведенной таблице (данные касаются содержания глюкозы в капиллярной крови).

	Норма	Нарушенная толерантность к глюкозе	Диабет
2-часовое значение, единицы СИ	< 7,8 ммоль/л	7,8-11,0 ммоль/л	≥ 11,1 ммоль/л
2-часовое значение (мг/дл)	< 140 мг/дл	140-199 мг/дл	≥ 200 мг/дл

Для венозной крови пороговые значения будут приблизительно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.

**Передозировка.** Не наблюдалось.

**Побочные эффекты.** Не зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Не отмечено.

**Срок годности.** 3 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25 °C.

**Упаковка.** По 75,75 г порошка в пакетах, вложенных в пачку.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

КОНТРОЛЬНИЙ