

## ІНСТРУКЦІЯ

### для медичного застосування препарату

#### ГУНА-БОВЕЛ

Склад лікарського засобу:

100 мл крапель оральних містять:

*діючі речовини:* Aloe D2 – 12,435 мл, Carduus marianus D2 – 12,435 мл, Chelidonium majus D2 – 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 – 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 – 12,435 мл, Rheum D2 – 12,435 мл, Taraxacum D2 – 12,435 мл, Cholecalciferol D2 – 4,350 мл, Niacin D2 – 3,875 мл, Pantothenic acid D2 – 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 – 0,039 мл, Alumina D6 – 0,044 мл, Alumina D8 – 0,044 мл, Bryonia alba D6 – 0,044 мл, Bryonia alba D8 – 0,044 мл, Colon suis D6 – 0,044 мл, Colon suis D12 – 0,044 мл, Colon suis D30 – 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 – 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 – 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 – 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 – 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 – 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 – 0,039 мл, Nux vomica D6 – 0,039 мл, Nux vomica D8 – 0,039 мл, Rectum suis D6 – 0,039 мл, Rectum suis D12 – 0,039 мл, Rectum suis D30 – 0,039 мл, Skatolum D6 – 0,039 мл, Skatolum D10 – 0,039 мл.

*допоміжні речовини:* етанол 96%, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

мл препарату містить 21 краплю.

#### **Лікарська форма.**

Краплі оральні.

## ♥ Аптека інтернет це ♥

Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору із запахом спирту етилового.

### **Назва і місцезнаходження виробника.**

Гуна С.п.а.

Вул. Пальманова, 69, 20132 Мілан, Італія.

### **Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат.

### **Показання для застосування.**

Симптоми, спричинені атонічними та спастичними запорами, дисбіозом, здуттям живота, порушенням функцій товстого кишечника, синдромом подразненого кишечника; при порушеннях функції печінки внаслідок нераціонального харчування; в комплексному лікуванні геморою.

### **Протипоказання.**

Немає.

### **Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Під час прийому препарату бажано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених і гострих продуктів, продуктів зі свинини, кави.

### **Особливі застереження.**

#### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Немає досвіду застосування.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.

**Діти.**

Застосовують дітям віком від 3 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Приймати натще. Перед кожним прийомом інтенсивно збовтати 10-15 разів.

Дорослі та діти віком від 12 років: 10-15 крапель 3 рази на добу зі столовою ложкою води за 15 хвилин до прийому їжі або через годину після прийому їжі протягом 2 місяців. На початку лікування за необхідності отримання швидкого результату рекомендований прийом по 10-15 крапель 5 разів на добу протягом 5-7 днів.

Діти: 3-6 років – 5-7 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому);

6-12 років – 7-10 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому).

Курс лікування – 3 місяці.

**Передозування.**

Не виявлено.

**Побічні ефекти.**

Небажані впливи невідомі. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

**Особливості застосування.**

При запорах і колітах рекомендується поєднувати прийом препаратів Гуна-Бовел та Еубіофлор. При запорах психосоматичного генезу рекомендується поєднувати прийом Гуна-Бовел з Гуна-Протистрес.

**Термін придатності.**

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.