

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.11.12 № 945
Реєстраційне посвідчення
№ УА/2122/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГРИЦІКІВ ТРАВА
(**HERBA BURSAE PASTORIS**)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: грициків трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина: шматочки листків, стебел та суцвіть різноманітної форми, окремі квітки та плоди, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір стебел, листків та плодів зелений, квіток – білуватий. Запах слабкий. Сmak гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що стимулюють тонус та скорочувальну активність міометрія. Код ATC G02A X.

Біологічно активні речовини рослини виявляють кровоспинну, в'яжучу, протизапальну, гіпотензивну, сечогінну та жовчогінну дію; посилюють скорочувальну діяльність гладкої мускулатури матки, активізують моторику шлунка та прискорюють перистальтику кишечнику.

Показання для застосування.

Атонії матки, маткові кровотечі (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Підвищene згортання крові, тромбоемболія (в анамнезі). Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано (підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не рекомендується застосовувати дітям.

Способ застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 4-5 разів на добу після їди.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При тривалому застосуванні – зниження артеріального тиску, гіперкоагуляція.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідомі.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 40 г або по 50 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу