

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
08.06.12 № 429
Реєстраційне посвідчення
№ УА/6654/01/01

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 %

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: іхтіол;

1 г мазі містить 0,1 г іхтіолу;

допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь темно-бурого кольору з запахом іхтіолу.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X.

Фармакологічні властивості мазі іхтіолової зумовлені дією біологічно активних речовин іхтіолу. Мазь іхтіолова виявляє антимікробну (бактерицидну та бактериостатичну), протизапальну та місцевознеболювальну дію.

При зовнішньому застосуванні іхтіолова мазь практично не абсорбується в системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

Показання для застосування. Опіки, екзема, бешихове запалення, невралгія, артрити.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Уникати потрапляння мазі на слизові оболонки. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалась.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не описаний.

Діти.

Досвід застосування дітям не описаний.

Спосіб застосування та дози. Мазь застосовувати зовнішньо. Препарат наносити на уражену ділянку 2-3 рази на день відкритим або закритим (під пов'язкою) способом. Тривалість застосування зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.

Передозування. Повідомлень про випадки передозування не надходило.

Побічні ефекти. Можливі місцеві або генералізовані прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, свербіж, печіння, почервоніння шкіри, частіше на початку лікування або при тривалому застосуванні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Несумісний з розчинами йодистих солей, алкалоїдів, солей важких металів.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище +25 °С; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г у контейнерах; по 30 г у тубах в пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу