

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.11.12 № 921
Реєстраційне посвідчення
№ UA/7242/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА
CALENDULAE TINCTURA

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 флакон містить настойки квіток та квіткових кошиків календули (Calendulae flos) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) – 40 мл або 50 мл;

Лікарська форма. Настойка.

Рідина жовтаво-коричневатого кольору. При зберіганні допускається випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що сприяють загоюванню ран. Код ATC D03A X.

Біологічно активні речовини, що містяться у квітках та квіткових кошиках календули, чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Застосовувати місцево як антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках щікі та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна); внутрішньо – як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед початком лікування препаратом слід обов'язково проконсультуватися з лікарем. Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати внутрішньо протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати внутрішньо жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

При прийомі настойки внутрішньо слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Не рекомендується приймати внутрішньо дітям до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Календули настойку приймати внутрішньо за 15-30 хвилин до їди, розводячи у невеликій кількості теплої кип'ячені води. Дорослим рекомендується приймати по 10-20 крапель настойки 3-4 рази на добу протягом 1 місяця. Дітям від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на добу.

Для полоскань порожнини рота 1 чайну ложку календули настойки розвести у склянці теплої кип'ячені води.

Застосовують для місцевих аплікацій при порізах, гнійних ранах, опіках. Розводять 1 чайну ложку препарату у склянці кип'ячені води.

Тривалість та спосіб застосування визначається лікарем індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Можливий розвиток алергічних реакцій (у т.ч. почервоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк). При прийомі внутрішньо можливі відчуття гіркоти у роті, відчуття печіння в епігастральній ділянці, біль у животі. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Календули настойка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів (зокрема препаратів на основі ромашки та деревію). При застосуванні одночасно з будь-якими іншими лікарськими засобами слід повідомити лікаря.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у захищенному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл або 50 мл у флаконах; по 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу