

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.12.12 № 1136
Регстраційне посвідчення
№ УА/1333/04/01

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

АРАЛІЙ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: настойка коренів аралії (Radices Araliae)(1:5) (екстрагент – етанол 70 %);
1 флакон містить настоїки коренів аралії (1:5)(екстрагент – етанол 70 %) 50 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина жовтого кольору, пряного смаку, із своєрідним запахом. Допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби. Код ATC A13A.

Препарати із коренів аралії виявляють стимулюючий вплив на центральну нервову систему, гонадотропний і деякий кардіотонічний ефекти.

Показання для застосування. Астеноневротичні стани, астенії, фізична та розумова перевтома, імпотенція, гіпотенція – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена збудливість, бессоння, артеріальна гіпертензія, епілепсія.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не рекомендується приймати препарат у другій половині дня.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати внутрішньо жінкам у періоди вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. При прийомі настойки слід утримуватися від керування автотранспортними засобами або роботи з потенційно-небезпечними механізмами.

Діти. Оскільки досвід застосування препарату дітям відсутній, його не рекомендується призначати цій віковій категорії пацієнтів.

Способ застосування та дози. Препарат приймають внутрішньо по 30-40 крапель до прийому їжі 2-3 рази на добу. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від перебігу захворювання, індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування. При тривалому та безконтрольному застосуванні препарату можливе безсоння, підвищення артеріального тиску. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти. Безсоння, підвищення артеріального тиску. В окремих випадках можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи крапив'янку, свербіж.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C, у захищенному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах. По 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу