

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25.10.12 № 837
Реєстраційне посвідчення
№ СEA/2254/09/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

БЕРЕЗИ БРУНЬКИ
(GEMMAE BETULAE)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: бруньки берези.

Лікарська форма. Бруньки.

Бруньки подовжено-конічні, загострені або притуплені, часто клейкі. Луски розташовані черепицеподібно, щільно притиснуті з країв, трохи війчасті (нижні коротші за верхні та іноді з кінчиками, які трохи відстають); довжина бруньок 3-7 мм, ширина – 1,5-3 мм.

Колір бруньок коричневий, біля основи трохи зеленкуватий. Запах бальзамічний, приемний. Сmak трохи в'яжучий, смолистий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віоля».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група.

Нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю. Код ATC C03B X.

Показання для застосування.

Хронічні запальні захворювання нирок та сечового міхура; сечокам'яна хвороба; набряки серцевого походження; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів із порушенням жовчовиділення; ларингіти, бронхіти, трахеїти.

Протипоказання.

Ниркова недостатність, гострі запальні захворювання нирок, гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату, наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія; епілепсія.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Перед початком лікування слід проконсультуватися з лікарем. При появі дизуричних явищ, гарячки, спазмів або крові у сечі слід звернутися до лікаря.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не описано.

Діти. Не призначають дітям до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку бруньок вмістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настоя. Об'єм настоя довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим прийняти у теплому вигляді по 1/3 склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Діти 12-14 років – по 1/4 склянки, від 14 років – по 1/3 склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні ефекти.

Діарея. Можливі прояви подразнювальної дії настоя на тканину нирок; алергічні реакції, включаючи свербіж, висипання на шкірі, алергічний риніт, крапив'янку, гіперемію та набряк шкіри. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C; приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °C) місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 10 г у пакетах; по 10 г або 20 г, або 50 г у пакети з вкладанням у пачку.

Категорія відпуску. Без рецептів.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу