

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЕВКАЛІПТА ЛИСТЯ**  
**(EUCALYPTI FOLIUM)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* евкаліпта листя.

**Лікарська форма.** Листя.

Подрібнена сировина: шматочки листя різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.

Порошок крупний: шматочки листя різноманітної форми, подрібнені до розміру часток близько 4 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ «Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для застосування у стоматології.

Код АТС А01А D11.

Евкаліпта листя містять олію ефірну, флавоноїди, речовини дубильні, кислоту елагову, хлорофіл, фенолокислоти. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє антисептичну, протизапальну, болезаспокійливу, в'язучу, репаративну і відхаркувальну дію. Препарати з листя евкаліпта згубно діють на стрептококи, стафілококи, дизентерійну та кишкові палички, гнійних та анаеробних збудників, сприяють швидкому загоєнню ран.

**Показання для застосування.**

Зовнішньо при захворюваннях ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів (стоматити, гінгівіти, ларингіти, фарингіти, трахеїти), свіжих та інфікованих ранах, запальних захворюваннях жіночих статевих органів.

**Протипоказання.**

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі. Бронхіальна астма, бронхоспазм, коклюш, несправжній круп.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Препарат застосовують дітям старше 3 років.

**Спосіб застосування та дози.**

10 г (2 столові ложки) листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед застосуванням настій збовтати.

Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскання 3-4 рази на добу: дорослим та дітям старше 12 років – 1 столову ложку настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 7-12 років – 1 десертну ложку настою розвести у 200 мл кип'яченої води; 3-7 років – 1 чайну ложку настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

1-2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15 хв. Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскання 3-4 рази на добу: дорослим та дітям старше 12 років – 2 столові ложки отриманого настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 7-12 років – 1 столову ложку отриманого настою розвести у 200 мл кип'яченої води; 3-7 років – 1 десертну ложку отриманого настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

У гінекологічній та хірургічній практиці використовувати у вигляді примочок, промивань і спринцювань.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2-х діб.

**Передозування.**

При тривалому та частому інгаляційному застосуванні можлива сухість слизових оболонок органів дихання.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

