

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
02.12.22 № 869
Реєстраційне посвідчення
№ УА/2269/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

**ФІАЛКИ ТРАВА
(HERBA VIOLAE)**

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: фіалки трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина: шматочки стебел (зеленого або світло-зеленого кольору), листків (зеленого), квіток (синього, фіолетового та світло-жовтого кольору) різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Запах слабкий. Сmak солодкуватий із відчуттям слизькості.

Порошок крупний: шматочки стебел (зеленого або світло-зеленого кольору), листків (зеленого), квіток (синього, фіолетового та світло-жовтого кольору) різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Запах слабкий. Сmak солодкуватий із відчуттям слизькості.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віоля».
69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код ATC R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять антисептичну, протизапальну, бронхолітичну, відхаркувальну, слабку діуретичну, жовчогінну і спазмолітичну дію.

Показання для застосування.

Захворювання верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утрудненим відходженням мокротиння (гострі та хронічні бронхіти, бронхопневмонії, коклюш), запальні захворювання нирок і сечового міхура, сечокам'яна хвороба – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до саліцилатів. Гломерулонефрит, гепатит.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 3 років за призначенням лікаря.

Способ застосування та дози.

1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/3-1/2 склянки, дітям 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2-1 склянці, дітям 12-14 років – по 1/2 склянки, 7-12 років – по 1/3 склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Передозування та тривале застосування препарату призводять іноді до виникнення нудоти, блювання, діареї, алергічних висипань на шкірі.

Побічні ефекти.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції, у т.ч. висипання на шкірі, нудота, блювання, діарея.

При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецептів.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу