

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
28.11.12 № 945
Реєстраційне посвідчення
№ UA/2155/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГІРЧАКА ПТАШИНОГО ТРАВА
(POLYGONI AVICULARIS HERBA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: гірчака пташиного трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина: шматочки стебел, листків та квіток різноманітної форми, які проходять крізь сито з діаметром отворів 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Сmak трохи в'яжучий.

Порошок крупний: шматочки стебел, листків та квіток різноманітної форми, які проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Сmak трохи в'яжучий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в урології. Код ATC G04B C.

Біологічно активні речовини трави запобігають утворенню і сприяють виведенню сечових конкрементів при сечокам'яній хворобі, посилюють діурез, виводять із сечею надлишок іонів натрію і хлору, збільшують фільтрацію у ниркових клубочках і зменшують зворотну резорбцію у ниркових канальцях, зменшують проникність стінок кровоносних судин.

Показання для застосування.

Початкові стадії сечокам'яної хвороби; сечокислий діатез; післяопераційний період після видалення сечових конкрементів; хронічна ниркова недостатність; хронічний гломеруло-нейфрит, піелонефрит, запалення сечового міхура у стадії ремісії (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Тромбофлебіт; гострі запальні захворювання нирок і сечового міхура; зміна реологічних властивостей крові; наявність у сечовивідніх шляхах каменів розміром більше 6 мм. Гіпер-чутливість до біологічно активних речовин препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Рекомендовано приймати настій через соломинку, щоб запобігти попаданню його на зуби (можливе розчинення емалі та пошкодження зубів).

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 7 років.

Спосіб застосування та дози. З столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети покласти у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15 хв.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим – по 1/3-1/2 склянки, дітям від 14 років – по 1/4 склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці.

Курс лікування – до 20-25 днів. Повторні курси (не більше 4-х на рік) проводити після 10-12 денної перерви (після консультації з лікарем).

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), ниркова коліка. Тривалий прийом препаратору може привести до дискорилізації зубної емалі та порушення структури кісткової тканини (остеопорозу).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не застосовувати разом з антикоагулянтами.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °C) місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пакети з вкладанням у пачку; по 1,5 г у фільтр-пакети, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецептa.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу