

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
*25.04.13 № 343*  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№** *СА/2723/2010*

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ГРУДНИЙ ЗБІР № 2**  
**(SPECIES PECTORALES № 2)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 г збору містить: мати-й-мачухи листя (*Farfarae folia*) 400 мг, подорожника великого листя (*Plantaginis majoris folium*) 300 мг, солодки коренів (*Liquiritiae radix*) 300 мг.

**Лікарська форма. Збір.**

Подрібнена сировина: жовтувато-зеленкуватого кольору суміш шматочків листів мати-й-мачухи, подорожника та кореня солодки, подрібнених до розміру часточок близько 5 мм. Запах відсутній; смак водної витяжки нудно-солодкий та трохи слизистий;  
порошок крупний: жовтувато-зеленкуватого кольору суміш шматочків листів мати-й-мачухи, подорожника та кореня солодки, подрібнених до розміру часточок близько 2 мм. Запах відсутній; смак водної витяжки нудно-солодкий та трохи слизистий.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».  
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальний засіб. Код АТС R05C A10.

Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну, протизапальну, обволікаючу дію та дію, що пом'якшує кашель; посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, зменшують кашель.

**Показання для застосування.**

Запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіт, бронхопневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) – у складі комплексної терапії.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Цироз печінки, хронічна ниркова недостатність, цукровий діабет, гіпокаліємія, артеріальна гіпертензія, органічні ураження серця, ожиріння.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Не рекомендується застосовувати.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не встановлена.

*Діти.* Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/2 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1 склянці, дітям 12-14 років – по 1/2 склянки, 7-12 років – по 1/4 склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

**Передозування.** Не виявлено.

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу