

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25.10.12 № *834*
Реєстраційне посвідчення
№ *UA/2927/09/09*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КРОПИВИ ЛИСТЯ
(URTICAE FOLIUM)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: кропиви листя.

Лікарська форма. Листя.

Подрібнена сировина: шматочки листків різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір темно-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Порошок крупний: шматочки листків різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Колір темно-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Гемостатичні засоби.
Код АТС В02В Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять кровоспинну, діуретичну, загальнозміцнюючу, протизапальну та судинозвужувальну дію, сприяють збільшенню вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, нормалізують склад крові, знижують рівень цукру в крові, сприяють регенерації слизових оболонок травного тракту, нормалізують ліпідний обмін.

Показання для застосування. Легеневі, кишкові, маткові, гемороїдальні та інші кровотечі; анемії різної етіології; захворювання травного тракту (гастрити, коліти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові; кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її придатків; артеріальна гіпертензія.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказаний у період вагітності. У жінок, які годують груддю, посилює лактацію.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не описана.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 5 років.

Спосіб застосування та дози. 2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати в проціджений настій. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 12 років – по 1/4-1/2 склянки, дітям 5-7 років – по 1 столовій ложці, дітям 7-12 років – по 2 столові ложки.

Перед застосуванням настій збовтати.

2,фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 12 років – по 1/2-1 склянці, дітям 5-7 років – по 2 столові ложки, дітям 7-12 років – по 1/4 склянки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Нудота, блювання, діарея, біль у ділянці шлунка; алергічні реакції (включаючи гіперемію, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакети, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу