

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
25.10.12 № 837
Реєстраційне посвідчення
№ УА/2444/09/09

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З ПРИЙМОЧКАМИ
(STYLI CUM STIGMATICIS ZEAE MAYDIS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: кукурудзи стовпчики з приймочками.

Лікарська форма. Стовпчики з приймочками.

Подрібнена сировина. Нитковидні шматочки коричневого, коричнево-червоного, світло-жовтого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Запах слабкий, своєрідний. Сmak із відчуттям слизькості.

Порошок крупний. Нитковидні шматочки коричневого, коричнево-червоного, світло-жовтого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Запах слабкий, своєрідний. Сmak із відчуттям слизькості.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній патології.

Код АТС A05A X.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, діуретичну (збільшують на 150 – 160 % відтік сечі), кровоспинну і гіпоглікемічну дію; збільшують секрецію жовчі, зменшують її в'язкість, знижують вміст білірубіну, підвищують вміст протромбіну в крові і прискорюють її згортання, сприяють виведенню із сечею уратів, оксалатів, фосфатів.

Показання для застосування. Холецистити, холангіти, гепатити з порушенням жовчовиділення; цистити, сечокам'яна хвороба, набряки; геморагічні діатези, кровотечі, спричинені зниженням рівня протромбіну (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, збільшений протромбіновий індекс, тромбофлебіт, жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, обтураційна жовтяниця, анорексія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування грудю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям старше 3 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози. З столові ложки стовпчиків з приймочками помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям старше 14 років – по 1-3 столові ложки; дітям віком 10-14 років – по 1 столовій ложці, 7-10 років – по 1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети покласти у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям старше 14 років – по 2-6 столові ложки; дітям віком 10-14 років – по 2 столовій ложці, 7-10 років – по 2 десертній ложці, 3-7 років – по 2 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Не виявлене.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (у т.ч. почервоніння, висипання, риніт).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не вивчались.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 30 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу