

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**06.09.13 № 783**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ УА/2129/04/01**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА**  
**(RHIZOMATA CALAMI)**

**Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: лепехи кореневища.

**Лікарська форма.** Кореневища.

Подрібнені кореневища жовтуватого, рожевуватого, іноді зеленуватого кольору з пряно-гірким смаком. Запах сильний, приємний.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ «Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що підвищують апетит. Код АТС A15.

Біологічно активні речовини препарату, впливаючи на закінчення смакових рецепторів, підвищують апетит, покращують травлення, посилюють рефлекторне виділення шлункового соку, посилюють жовчовидільну функцію печінки, підвищують тонус жовчного міхура, збільшують діурез.

Водні витяжки із лепехи кореневищ проявляють тонізуючу, протизапальну, відхаркувальну, жовчогінну, спазмолітичну, антибактеріальну і дезінфікуючу дію.

**Показання для застосування.**

Неспецифічні розлади функції травного тракту (відсутність апетиту, розлади травлення і секреції шлунка, ахілія, кишкові коліки, метеоризм – у складі комплексної терапії). Місцево при запальних захворюваннях порожнини рота і горла.

**Протипоказання.**

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин лікарського засобу. Підвищена кислотність шлункового соку.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Лепехи кореневища протипоказані для застосування у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Немає даних щодо впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

***Діти.***

Препарат застосовувати дітям віком від 7 років.

**Способ застосування та дози.**

10 г (1 столова ложка) кореневищ помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 10 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу, за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/4 склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, дітям 7-12 років – по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати. Приготовлений відвар у розведеному вигляді (розводити водою у 2-3 рази) застосовувати для полоскання порожнин рота і горла.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити кришкою і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу, за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/2 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/4 склянки, дітям 7-12 років – по 2 столові ложки. Приготовлений настій застосовувати для полоскання порожнин рота і горла.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

**Передозування.**

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції, включаючи крапив'янку, висипання на шкірі, свербіж та набряки.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Знижує ефективність антацидів, блокаторів Н<sub>2</sub>-рецепторів (ранітидину, фамотидину).

**Термін придатності.** 3 роки.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
регистраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу