

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН
(SOLUTIO LUGOLI)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: йод, калію йодид;
100 г розчину містять йоду 1 г, калію йодиду 2 г;
допоміжні речовини: гліцерин, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.
Код АТС R02A A20.

Люголя розчин з гліцерином чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грамполозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

Показання для застосування.

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гіперфункція щитовидної залози; декомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат.

З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму; при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не досліджувалася.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

Спосіб застосування та дози.

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

Передозування.

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слезотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Лікування. негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слезотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість), реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

Термін придатності.

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у флаконах. По 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу