

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

16.11.12 № 921

Ресстраційне посвідчення

№ UA/2359/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ
(FOLIA FARFARAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: мати-й-мачухи листя.

Лікарська форма. Листя.

Шматочки листків різноманітної форми. Колір сірувато-зелений. Без запаху. Смак слабко-гіркуватий із відчуттям слизькості.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальний засіб. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, пом'якшувальну, потогінну, спазмолітичну дію: відновлюють активність вільчастого епітелію трахеї і бронхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, чинять обволікаючу дію на слизову оболонку порожнини рота та гортані, захищаючи її від подразнення.

Показання для застосування. Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, хронічні бронхіти, бронхопневмонії, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь від застосування для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям віком від 3 років (за призначенням лікаря).

Спосіб застосування та дози. 2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/3-1/2 склянки 2-3 рази на добу за 1 годину до їди або по 1 столовій ложці 4-6 разів на добу. Дітям віком 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу за 1 годину до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлень немає.

Побічні ефекти. При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 40 г або 50 г у пакеті, вкладеному у пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу