

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України**

*14.01.13 № 5*

**Реєстраційне посвідчення**

*№ УА / 2264/02/01*

**ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування препарату**

**ПОЛИНУ НАСТОЙКА**

**Склад лікарського засобу:**

*дюча речовина:* настойка трави полину (Absinthii herba) (1:5);

1 флакон містить настойки трави полину (Absinthii herba) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл.

**Лікарська форма.** Настойка.

Прозора рідина бурувато-зеленого кольору, характерного запаху, з гірким смаком. Суміш препарату з водою (2:1) дає мутний розчин.

Допускається утворення осаду при зберіганні.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віоля».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що підвищують апетит. Код ATC A15.

Полину настойка містить гіркоти. Механізм дії препарату обумовлений подразненням чутливих нервових закінчень – смакових рецепторів слизових оболонок порожнини рота, язика, що рефлекторним шляхом спричиняє посилення секреції шлункового соку, підвищення апетиту, покращання процесу травлення.

**Показання для застосування.**

Гіпоацидні та анацидні гастрити, анорексія – у складі комплексної терапії.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена шлункова секреція, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишki, рефлюкс-езофагіт, жовчокам'яна хвороба, епілепсія. Наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Оскільки до складу препарату входить етанол, він може впливати на здатність керувати автотранспортними засобами або працювати з потенційно небезпечними механізмами, тому на період лікування препаратом слід утриматися від роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Діти.**

Не слід застосовувати дітям до 12 років. Дітям від 12 років препарат застосовують за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

Полину настойку дорослим та дітям від 12 років приймати по 15-20 крапель 3 рази на добу за 15-30 хвилин до їди. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від тяжкості захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту.

**Передозування.**

Застосування у підвищених дозах, особливо тривале, може привести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій, втрати свідомості.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори.

**Лікування.** Симптоматичне.

**Побічні ефекти.**

Тривале застосування полину настоїки може спричинити так звану полинну епілепсію. Нудота, блювання, можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж). При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не виявлена.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °C у захищенному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається утворення осаду.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах. По 1 флакону у пачці або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**