

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

12. 10. 12 № 791
Реєстраційне посвідчення
№ 111/6610/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

**РОМАШКИ КВІТКИ
(MATRICARIAE FLOS)**

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: ромашки квітки.

Лікарська форма. Квітки.

Суцільна сировина: суцільні квіткові кошики або кошики, які частково обсипалися, напівшаровидної або конічної форми, без квітконосів або із залишками їх не довше 3 см. Кошик складається з крайових язичкових маточкових та серединних двостатевих трубчастих квіток. Квітколоже голе, дрібномчасте, всередині порожнисте, з початку цвітіння напівшаровидне, в кінці – конічне. Обгортка кошика – черепитчасти, багаторядна, яка складається із численних подовжених із тупими верхівками та широкими плівчастими краями листочків. Розмір кошика (без язичкових квіток) – 4-8 мм у поперечнику. Колір язичкових квіток білий, трубчастих – жовтий, обгортки – жовтувато-зелений. Запах сильний, ароматний. Сmak пряний, гіркуватий, трохи слизистий.

Порошок крупний: суміш шматочків язичкових та трубчастих квіток, обгорток кошиків, залишків квітконосів різноманітної форми. Колір язичкових квіток білий, трубчастих – жовтий, обгортки – жовтувато-зелений. Запах сильний, ароматний. Сmak пряний, гіркуватий, трохи слизистий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТС A16A X.

Біологічно активні речовини препарату чинять спазмолітичну, болезаспокійливу, протизапальну, атисептичну, потогінну, жовчогінну дію; знижують алергічні реакції, посилюють процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми кишечнику, зменшують бродильні процеси.

Показання для застосування. Внутрішньо застосовують при гастритах, запальних захворюваннях печінки та жовчного міхура, ентероколітах, метеоризмі, застудних захворюваннях. Зовнішньо – при запальних захворюваннях порожнини рота і горла.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Перед застосуванням настій рекомендується збовтувати.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Застосовують дітям старше 6 місяців за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози. 3 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/3 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці, 1-3 роки – по 1 десертній ложці, 6 місяців-1 рік – по 1/2-1 чайній ложці.

Зовнішньо настій використовують для полоскань 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по 2/3 склянки, 7-12 років – по 1/2 склянки, 3-7 років – по 1/4 склянки, 1-3 роки – по 2 столові ложки, 6 місяців-1 рік – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо настій застосовувати для полоскань 3-4 рази на добу.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 1 рік 6 місяців.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 40 г або 50 г у пакети з вкладанням у пачку; по 1,5 г у фільтр-пакети з наступним вкладанням по 20 фільтр-пакетів у пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу