

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
08.06.12 № 429  
**Реєстраційне посвідчення**  
№ UA/6546/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**СПИРТ МУРАШИНИЙ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* кислота мурашина;  
100 мл препарату містять кислоти мурашиної 1,4 г;  
*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування спиртовий.

Прозора, безбарвна рідина із специфічним різким запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ПрАТ “Фармацевтична фабрика “Віола”.  
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

**Код АТС** M02A X10.

Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

**Показання для застосування.**

Невралгії, міозити, артралгії.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Запобігати потраплянню препарату на слизові оболонки та в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

**Термін придатності.** 3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 40 мл або 50 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доосьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу