

ЗАТВЕРЖДЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
120413 № 593
Реєстраційне посвідчення
№ СДА/2195/0901

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР № 2
(SPECIES SEDATIVAE № 2)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г збору містить: пустирника трави (Leonuri cardiaca herba) 400 мг, хмелью шишок (Lupuli flos) 200 мг, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 150 мг, валеріани кореневищ з коренями (Valerianae radix) 150 мг, солодки коренів (Liquiritiae radix) 100 мг.

Лікарська форма. Збір.

Подрібнена сировина: суміш неоднорідних часток розміром близько 5 мм сірувато-зеленого кольору із світло-жовтими, жовтими та сірувато-буруватими включеннями. Запах ароматний. Сmak солодкувато-гіркий.

Порошок крупний: суміш неоднорідних часток розміром близько 2 мм сірувато-зеленого кольору із світло-жовтими, жовтими та сірувато-буруватими включеннями. Запах ароматний. Сmak солодкувато-гіркий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика “Віола”.
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та заспокійливі препарати. Код ATC N05C M.

Біологічно активні речовини препарату чинять седативну, спазмолітичну дію, зменшують збудливість центральної нервової системи.

Показання для застосування.

Безсоння, нейроциркуляторна дистонія, підвищена збудливість, неврастенія – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Депресія та захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи; порушення функції печінки та нирок; бронхіальна астма, гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю застосовують хворим з шлунково-стравохідним рефлюксом, печією, міокардитом, перикардитом, інфарктом міокарда, брадикардією.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини. За необхідності застосування препарату годування груддю необхідно припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. З обережністю застосовувати особам, які керують транспортом або працюють з іншими механізмами.

Діти. Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл кип'яченої води, нагріти на водяній бані 15 хвилин, потім настояти при кімнатній температурі 45 хвилин і процідити. Сировину, що залишилася, віджати, і одержаний об'єм настоя довести кип'яченою водою до початкового об'єму 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/3 склянки настоя, дітям віком від 12 років – по 1/4 склянки настоя за 20-30 хвилин до їди 2 рази на добу. Курс лікування становить 2-4 тижні.

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настояти 15 хвилин. Дорослим приймати внутрішньо в теплому вигляді по 1 склянці 2 рази на добу, дітям віком від 12 років – по 1/2 склянки за 20-30 хвилин до прийому їжі. Курс лікування складає 2-4 тижні.

Передозування.

При передозуванні можливі порушення водно-електролітного балансу, підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення, що потребує відміни препарату. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, крапив'янка, контактний дерматит), пригнічення емоційних реакцій, сонливість, головний біль, запаморочення, відчуття слабкості, зниження розумової та фізичної працездатності, гіпокаліємія.

При появі подібних або інших незвичніх реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися за консультацією до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Настій можна поєднувати з іншими заспокійливими і серцево-судинними засобами. Може посилити гіпокаліємію одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідіном), тіазидними та петлевими діуретиками, проносними засобами. Посилює дію снодійних, аналгетичних, антигіпертензивних препаратів, серцевих глікозидів та алкоголю.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2-х діб.

Упаковка. По 50 г або по 75 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті №20 у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу