

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
26.08.08 № 491
Реєстраційне посвідчення
№ УА /0725/61/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАМФОРНА ОЛЯ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл рідини містить 0,1 г камфори рацемічної;
допоміжна речовина: олія соняшникова.

Лікарська форма. Олія для зовнішнього застосування.

Прозора рідина жовтого кольору із характерним запахом камфори.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовують місцево при суглобовому та м'язовому болю. Код АТС M02A X10.

Камфорна олія при місцевому застосуванні чинить протимікробну, протизапальну, відволікачу, знеболювальну дію та усуває свербіж шкіри.

Ці властивості зумовлені наявністю в молекулі камфори функціонально активної молекули кисню, яка має високий окиснювальний потенціал, порушує клітинні мембрани мікроорганізмів, руйнує багато активних сполук, що спричиняють запалення, біль і подразнення чутливих рецепторів шкіри.

Показання для застосування.

Призначають при ревматизмі, артритах, артралгії, міозитах, міалгії, ішіасі, шкірному свербежі.

Протипоказання.

Захворювання шкіри різного характеру в місці застосування препарату. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Застосовується з урахуванням співвідношення користь для жінки/риск для плода (дитини), яке визначає лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не досліджувалася.

Діти.

Не застосовують дітям через відсутність клінічного досвіду.

Спосіб застосування та дози.

Камфорну олію застосовують зовнішньо дорослим як самостійно, так і в комбінації з метилсаліцилатом, скіпидаром та іншими лікарськими засобами для місцевого застосування. Застосовують зовнішньо для розтирання і компресів при зазначених патологічних процесах. Спосіб застосування, кількість аплікацій, тривалість однієї аплікації зумовлені характером захворювання, його вираженістю, характером супутньої терапії.

Передозування.

Не можливе.

Побічні ефекти.

В окремих випадках може спричинювати алергічні прояви у вигляді кро-пив'янки та подразнення шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищенному від світла місці при кімнатній температурі 15 -25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу