

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
230812 № *658*
Реєстраційне посвідчення
№ *UA/2188/04/04*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КРУШИНИ КОРА
(CORTEX FRANGULAE)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: кора крушини.

Лікарська форма. Кора.

Подрібнена сировина: шматочки кори різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір кори з зовнішньої поверхні темно-бурий, сіро-бурий, темно-сірий або сірий, з внутрішньої – жовтувато-оранжевий або червоно-бурий.

Порошок крупний: порошок жовто-бурого кольору, що проходить крізь сито з отворами розміром 2 мм.

Для усіх видів сировини запах слабкий, смак гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Код АТС А06А В07.

Біологічно активні речовини препарату чинять м'яку проносну дію, механізм якої полягає у посиленні перистальтики товстої кишки, не подразнюючи слизової оболонки і не впливаючи на тонкий кишечник. Послаблювальна дія настає через 8-12 годин після застосування.

Показання для застосування. Атонія кишечника, звичні запори.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Запори нейрогенного та ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі, синдром гострого живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Тривалий прийом препарату призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту. Щоб запобігти звиканню, доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Застосування препарату рекомендується дітям старше 12 років.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок

віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді дорослим по 1/2 склянки на ніч, дітям старше 12 років – по 1/4-1/3 склянки на ніч. Перед застосуванням відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хвилин. Застосовувати у теплом вигляді дорослим до 100 мл на ніч, дітям старше 12 років – по 1/4-1/3 склянки (50-60 мл) на ніч.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. При появі вказаних симптомів слід припинити прийом препарату. Лікування – симптоматичне.

Побічні ефекти. При тривалому застосуванні можуть розвинутися діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечника, атонія товстого кишечника, колікоподібний біль, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений відвар (настій) – у прохолодному (8 - 15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г або 100 г у пакети з вкладанням у пачку; по 1,5 г у фільтр-пакети, з наступною укладкою по 20 фільтр-пакетів у пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу