

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
17.03.10 № 234
Регистрационное удостоверение
№ UA/2714/02/01

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
16.08.13 № 727

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЛАМИКОН
(LAMICON)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: terbinafine;

1 г крема содержит тербинафина гидрохлорида в пересчёте на 100 % безводное вещество 0,01 г;

вспомогательные вещества: спирт фенилэтиловый, парафин белый мягкий, масло минеральное, спирт цетостеариловый, полиэтиленгликоль (макрогол) 20 цетостеариловый эфир, пропиленгликоль, полоксамер 407, натрия гидроксид, вода очищенная.

Лекарственная форма. Крем.

Крем белого или почти белого цвета со специфическим запахом.

Название и местонахождение производителя.

ПАО “Фармак”.

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

Фармакотерапевтическая группа. Противогрибковые препараты для местного применения. Код АТС D01A E15.

Тербинафин – это алиламин, имеет широкий спектр противогрибкового действия. Тербинафин в соответствующей концентрации оказывает фунгицидное действие относительно дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибов. Активность относительно дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Тербинафин специфически угнетает ранний этап биосинтеза стероидов в клеточной мембране гриба. Это приводит к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что ведёт к гибели клетки гриба. Тербинафин действует путём ингибирования фермента скваленоксидазы в клеточной мембране гриба. Этот фермент не принадлежит к системе цитохрома P450. Тербинафин не влияет на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

При наружном применении препарат абсорбируется менее 5 % от применяемой дозы, поэтому системная экспозиция тербинафина незначительная.

При местном применении препарат практически не всасывается, быстро начинает действовать, проявляет эффективность при кратковременном лечении (7 дней), концентрация тербинафина, необходимая для фунгицидного действия, присутствует в роговом слое эпидермиса в течение 7 дней после прекращения лечения.

КОНТРОЛЬНИЙ

Показания к применению.

Грибковые инфекции кожи, вызванные такими дерматофитами, как *Trichophyton* (например, *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*, например, дерматофития стоп, дерматофития туловища, паховая дерматофития.

Кандидоз кожи, вызванный грибками рода *Candida* (например, *Candida albicans*).

Разноцветный лишай (*Pityriasis versicolor*), вызванный *Pityrosporum orbiculare* (также известен под названием *Malassezia furfur*).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к тербинафину и к другим компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Крем предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании крема в глаза их необходимо тщательно промыть проточной водой.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Опыт применения препарата Ламикон женщинам во время беременности ограничен, поэтому в этот период его применяют только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Ламикон, крем, проникает в грудное молоко, поэтому препарат не следует применять в период кормления грудью. Следует избегать контакта новорожденного с кожей, на которую наносили крем.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Неизвестно.

Дети. Опыт применения препарата детям в возрасте до 12 лет ограничен, поэтому препарат не рекомендуется применять этой возрастной категории пациентов.

Способ применения и дозы.

Взрослым и детям старше 12 лет

Крем Ламикон наносят на кожу 1 или 2 раза в сутки. Перед нанесением крема необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Крем накладывают тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают. При инфекциях, сопровождающихся опрелостью складок кожи (под молочными железами, межпальцевых, между ягодицами, в паховой области), участки с нанесенным кремом можно прикрывать марлей, особенно на ночь.

Длительность лечения зависит от характера и тяжести течения заболевания.

Длительность и частота лечения:

Диагноз	Кратность применения в сутки	Курс лечения
дерматофития стоп	1 раз в сутки	1 неделя
дерматофития туловища и паховая дерматофития	1 раз в сутки	1 неделя
разноцветный лишай	1-2 раза в сутки	2 недели
кандидоз кожи	1-2 раза в сутки	1-2 недели

Облегчение симптомов обычно отмечается на протяжении нескольких дней. Нерегулярное применение или преждевременное прекращение лечения может привести к рецидиву.

Не нужно корректировать дозу для пациентов пожилого возраста.



Передозировка.

Передозировка препаратом Ламикон, крем, маловероятна из-за низкой системной абсорбции. Если крем случайно попал в желудок, необходимо вызвать рвоту или промыть желудок.

Побочные эффекты. В местах нанесения крема могут возникнуть покраснения кожи, ощущения зуда или жжения, однако необходимость прекращения лечения в связи с этим возникает редко.

Эти проявления следует отличать от аллергических реакций: зуд, кожная сыпь (в том числе буллезная), крапивница наблюдаются редко, но требуют отмены препарата. Поэтому в случае возникновения каких-либо побочных реакций необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С.

Замораживание не допускается.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 15 г в тубе алюминиевой, вложенной в пачку.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра. 16.08.2013.

КОНТРОЛЬНЫЙ