

МЕБИКАР IC (MEBIKAR IC)

MEBICARUM* N05B X05**

ИнтерХим

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

табл. 0,3 г, № 20 Мебикар 0,3 г

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Мибикар IC обладает умеренной транквилизирующей (анксиолитической) активностью, устраняет или снижает ощущение тревоги, напряженности, беспокойства и раздражения. Транквилизирующий эффект препарата не сопровождается миорелаксацией и нарушением координации движений. Не обладает снотворным эффектом, но усиливает действие снотворных средств и нормализует течение сна, если он нарушен. Благодаря этим свойствам препарат оказывает действие дневного транквилизатора и селективного анксиолитика. Мебикар IC облегчает или купирует никотиновую абстиненцию. Препарат обладает антиоксидантным и нормостеническим действием. При пероральном приеме 77–80% принятой дозы препарата проникает в кровь; около 40% связывается с эритроцитами, остаток — не связывается с белками крови и содержится в плазме крови в свободном состоянии, благодаря чему препарат без препятствий распространяется в организме и свободно проходит сквозь мембраны. Максимальная концентрация достигается за 0,5 ч, ее высокий уровень сохраняется на протяжении 3–4 ч, затем постепенно снижается. Мебикар IC полностью выводится из организма с мочой на протяжении суток. Препарат не накапливается и не подвергается биохимическим преобразованиям.

ПОКАЗАНИЯ:

неврозы и неврозоподобные состояния, которые сопровождаются раздражением, эмоциональной лабильностью, ощущением тревоги и страха; для улучшения переносимости нейролептиков с целью устранения вызванных ими соматовегетативных и неврологических побочных эффектов. Применяется как церебропротектор и адаптоген при эмоциональном и оксидантном стрессе различного генеза.

Препарат применяют во время комплексной терапии как средство, которое ослабляет никотиновую зависимость.

ПРИМЕНЕНИЕ:

препарат применяют у взрослых внутрь независимо от приема пищи. Дозирование зависит от индивидуальных особенностей человека и терапевтической цели назначения и может изменяться. Обычная доза составляет 300 мг (1 таблетка) 2–3 раза в сутки; при необходимости доза может быть повышена. Максимальная разовая доза — 3 г, суточная — 10 г. Продолжительность курса лечения — от нескольких дней до 2–3 мес.

При применении средств, ослабляющих никотиновую зависимость, препарат назначают по 600—900 мг (2–3 таблетки) 3 раза в сутки, ежедневно на протяжении 5–6 нед.

Если один или несколько раз прием препарата был пропущен, необходимо продолжить курс лечения согласно ранее назначенной схеме.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, период беременности и кормления грудью, детский возраст.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Мибикар IC малотоксичный, обычно переносится хорошо. Возможно снижение АД и температуры тела, которые нормализуются самостоятельно. Возможны аллергические реакции и диспептические нарушения после приема в высоких дозах. В этом случае необходимо снизить дозу или прекратить прием препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

с осторожностью необходимо применять при нарушениях функции печени и почек, у больных с артериальной гипотензией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат хорошо проникает во все ткани и жидкости организма. Не следует применять в период беременности или кормления грудью из-за отсутствия достаточных

клинических данных относительно применения препарата в этой группе пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не оказывает влияния на скорость психической и двигательной реакций.

Дети. Не применяют.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Мебикар IC можно комбинировать с нейролептиками, транквилизаторами (бензодиазепинами), снотворными, антидепрессантами и психостимуляторами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

при применении в высоких дозах возможны аллергические реакции и диспептические явления, временное снижение АД и температуры тела.

Лечение: общепринятые методы дезинтоксикации и промывание желудка.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

при температуре 15–25 °С.