

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ГЛЮКОЗА

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: dextrose; D-глюкоза;

1 таблетка содержит глюкозы моногидрата 1 г;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, кислота стеариновая.

Лекарственная форма. Таблетки.

Таблетки круглой формы с плоской поверхностью со скошенными краями и риской, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Код АТС А16АХ.

Глюкоза принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обеспечивает пополнение энергозатрат, улучшает антитоксическую функцию печени, увеличивает сократительную деятельность сердечной мышцы и диурез.

Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.

Показания к применению.

Гипогликемия. Восполнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.

Противопоказания. Сахарный диабет и различные состояния, сопровождающиеся гипергликемией. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Препарат не рекомендуют назначать больным с пониженной толерантностью к глюкозе.

При длительном применении высоких доз препарата необходим контроль уровня сахара в крови.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью.

Необходимо соблюдать дозировку и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Дети. Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата детям до 3 лет отсутствуют, поэтому данную лекарственную форму не применяют в этом возрасте.

Способ применения и дозы.

Взрослым и детям в возрасте от 3 лет: препарат принимают внутрь по $\frac{1}{2}$ -1 таблетке (0,5-1 г) в сутки.

Дозы и длительность лечения зависят от характера и течения заболевания, эффективности терапии.

Передозировка. *Симптомы:* при однократном применении большого количества препарата наблюдается нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос).

Лечение: отмена препарата. Симптоматическая терапия.

Побочные эффекты. У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Взаимодействие не известно.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 10 таблеток в контурных безъячейковых упаковках.

По 10 таблеток в блистерах.

По 10 таблеток в блистере; по 3 или 5 блистеров в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

