

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25.04.13 № 343
Реєстраційне посвідчення
№ УEA/2956/09/09

I Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
НАГІДОК КВІТКИ
(CALENDULAE FLOS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: нагідок квітки.

Лікарська форма. Квітки.

Суцільна сировина: цілі або частково обсипані кошики до 5 см у діаметрі, без квітконосів або із залишками квітконосів не більше 3 см завдовжки. Обгортка сіро-зелена, одно- дворядна, із лінійних, загострених, густо опушених листочків. Ложе кошика децço опукле, голе. Крайові квітки несправжньоязичкові, червонувато-оранжевого, оранжевого, яскраво- або блідо-жовтого кольору, 15-28 мм завдовжки, 3-5 мм завширшки, розташовані у 2-3 ряди у немахрових форм та у 10-15 рядів у махрових форм. Віночок несправжньоязичкових квіток має зігнуту, коротку, опущену трубку та тризубчастий, із 4-5 жилками відгин, який удвічі довший за обгортку. Маточка цих квіток із зігнутою нижньою одногніздою зав'яззю, тонким стовпчиком і дволопатевою приймочкою. Серединні квітки трубчасті з п'ятизубчастим віночком, оранжевого, жовтаво-коричневого або жовтого кольору.

Подрібнена сировина, порошок крупний: суміш шматочків квіток, квітконосів та обгорток кошиків різноманітної форми. Колір крайових квіток червонувато-оранжевий, оранжевий, яскраво- або блідо-жовтий; серединних – оранжевий, жовтувато-коричневий або жовтий. Запах слабкий. Сmak солонувато-гіркий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віоля».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код ATC R02A A20.

Комплекс біологічно активних речовин чинить протизапальну, ранозагоювальну, бактерицидну, спазмолітичну і жовчогінну дію, прискорює процеси регенерації тканин, сприяє загоєнню виразок і ерозій.

Показання для застосування.

Внутрішньо застосовують при гастритах, виразковій хворобі плунка і двадцятипалої кишки, колітах, ентероколітах, запальних захворюваннях печінки, жовчовивідніх шляхів та селезінки; зовнішньо – при захворюваннях ротової порожнини (молочниця у дітей, гінгівіти, піорея, запально-дистрофічна форма парадонтозу), ангінах, тонзилітах – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Внутрішньо препарат застосовують дітям від 3 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Суцільна сировина: 1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченого води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/3 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Подрібнена сировина: 1 десертну ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченого води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/3 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Порошок крупний: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/3 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Перед застосуванням настій збовтати.

Зовнішньо застосовують для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Приготовлений настій зберігати не більше 2 діб у прохолодному місці.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні ефекти.

Можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи гіперемію, висипання, свербіж, набрякання шкіри.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г або по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті №20 у пачці.

Категорія відпуску. Без рецептa.

Дата останнього перегляду.

Затверджено з матеріалами реєстраційного досьє та достовірно відомими даними щодо застосування лікарського засобу