

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
28.07.09 № 540
Регистрационное удостоверение
№ UA/1877/02/01
UA/1877/01/01

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
22.02.13 № 157

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

НО-СОЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
(NO-SOL MOISTURE)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: натрия хлорид;

1 мл раствора содержит натрия хлорида 6,5 мг;

вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат, дигидрат; натрия гидрофосфат, додекагидрат; спирт бензиловый; бензалкония хлорид; вода для инъекций.

Лекарственная форма. Капли назальные. Спрей назальный.

Прозрачная бесцветная жидкость со слабым характерным запахом.

Название и местонахождение производителя.

ПАО "Фармак".

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты для применения при заболеваниях полости носа.
Код АТС R01A X10.

Натрия хлорид является эффективным осмотически активным средством. В гипотоническом растворе натрия хлорида осмолярность ниже, чем у жидкостей тела. Поэтому введенный в полость носа раствор повышает гидратацию поверхности слизистой оболочки носа и содержимого носовой полости, что способствует увлажнению слизистой оболочки, разжижению густой слизи, размягчению сухих корок в носу и облегчает их удаление.

Показания к применению.

- В составе комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний носоглотки, придаточных пазух и носовой полости разной этиологии;
- профилактика инфекционных заболеваний носа и носоглотки в осенне-зимний период;
- подготовка к введению в полость носа других лекарственных средств (для улучшения их всасывания);
- лечение в послеоперационный период после вмешательств в носовой полости;

КОНТРОЛЬНИЙ

- ежедневная гигиена полости носа для сохранения защитных качеств слизистой оболочки в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (кондиционирование, центральное отопление, задымлённость помещения и т.п.).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат в виде спрея не следует применять детям в возрасте до 2 лет.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Чтобы избежать распространения инфекции, рекомендуется индивидуальное использование распылителя.

Непосредственно перед использованием нужно подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы согреть его до температуры тела.

При назначении препарата больным с тяжёлой сердечно-лёгочной недостаточностью необходимо контролировать электролитный состав крови.

Особые предостережения.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Может применяться в период беременности и в период кормления грудью по показаниям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и другими механизмами.

Дети.

Препарат в виде капель применяют для лечения детей с первых дней жизни.

Препарат в виде спрея применяют для лечения детей старше 2 лет.

Способ применения и дозы.

Капли назальные. Взрослым – по 2 капли; детям в возрасте от 1 года – по 1-2 капли; детям до 1 года – по 1 капле в каждый носовой ход с лечебной целью 3-4 раза в сутки, с гигиенической целью – 1-4 раза в сутки.

Курс лечения составляет до 4 недель. При необходимости можно повторить курс лечения через месяц.

Взрослые.

Перед началом процедуры необходимо вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения вытекания раствора необходимо лечь и запрокинуть голову назад, потом, стараясь не касаться капельницей флакона внутренних стенок носа, закапать препарат. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут. Остатки раствора удаляют с лица ватой или носовым платком.

Дети.

Перед началом процедуры вымойте руки с мылом и аккуратно освободите нос ребенка от слизи. После очищения носа от слизи закапайте капли «Но-Соль увлажняющий» в каждый носовой ход. При закапывании капель в правую ноздрю голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена вправо и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена влево при закапывании капель в левую ноздрю. Промывание делается в положении лежа. После закапывания следует посадить ребенка и помочь ему освободить нос от разжиженной слизи. Остатки раствора нужно аккуратно удалить с лица ватой или носовым платком.

Спрей назальный. Взрослым – по 2 впрыскивания, детям старше 2-х лет – по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической целью – 1-4 раза в сутки.

Курс лечения составляет до 4 недель. При необходимости можно повторить курс лечения через месяц.

КОНТРОЛЬНИЙ

Взрослые.

Убедитесь в целостности флакона. Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения вытекания раствора необходимо лечь и запрокинуть голову назад. Для применения снимают защитный колпачок с флакона, помещают наконечник в носовой ход, коротким резким движением нажимают насос-дозатор и, вынув наконечник из носа, разжимают. Во время впрыскивания рекомендуется слегка вдохнуть через нос. После впрыскивания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2-3 минут. Остатки раствора удаляют с лица ватой или носовым платком.

Дети старше 2 лет.

Перед началом процедуры вымойте руки с мылом и аккуратно освободите нос ребенка от слизи. После очищения носа от слизи, введите спрей «Но-Соль увлажняющий» в каждый носовой ход. При впрыскивании спрея в правую ноздрю голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена вправо и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена влево при впрыскивании спрея в левую ноздрю. Впрыскивание делается в положении лежа. После впрыскивания следует посадить ребенка и помочь ему освободить носик от разжиженной слизи. Остатки раствора нужно аккуратно удалить с лица ватой или носовым платком.

Передозировка.

Случаи передозировки не описаны.

Побочные эффекты.

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Данные о влиянии препарата на действие других лекарственных средств отсутствуют.

Можно применять с другими лекарственными средствами в составе комплексной терапии.

Срок годности. 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. *Капли.* По 10 мл во флаконе полиэтиленовом, вложенном в пачку.

Спрей. По 10 мл во флаконе стеклянном или по 15 мл во флаконе полиэтиленовом.

По 1 флакону с дозатором, вложенном в пачку.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра. 22.02.2013.

