

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02.08.12 № 610
Реєстраційне посвідчення
№ UA/2262/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ
(RHIZOMATA ET RADICES INULAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: оману кореневища з коренями.

Лікарська форма. Кореневища з коренями.

Подрібнена сировина: шматочки коренів та кореневищ різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий. Запах приємний. Смак пряний, гіркуватий.

Порошок крупний: шматочки коренів та кореневищ різноманітної форми, розміром 3-4 мм. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий. Запах приємний. Смак пряний, гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, антимікробну, жовчогінну, сечогінну, тонізуючу дію; нормалізують моторну і секреторну функції різних відділів шлунково-кишкового тракту, поліпшують обмін речовин.

Показання для застосування.

Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, гострі респіраторні захворювання, пневмонії); захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти, відсутність апетиту, розлади травлення).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тяжкі захворювання серцево-судинної системи, нирок.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю протипоказане застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям віком старше 3 років.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2 склянки, дітям 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 100 мл, дітям 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Передозування та тривале застосування спричиняють запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, набряк), печія, біль у животі. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами (у т.ч. лікарськими засобами, що містять кодеїн, декстрометорфан).

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар (настій) – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 4 г у фільтр-пакеті № 12 або по 4 г у фільтр-пакеті № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досяє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу