

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**19.02.09 № 107**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ UA 9396/01/01**

**ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**23.09.13 № 826**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* 5 мл сиропа содержат плюща обыкновенного листьев экстракта сухого 35 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия цитрат; кислота лимонная, моногидрат; сорбит (Е 420) – 1925 мг; калия сорбат – 6,7 мг; ксантановая камедь; ароматизатор пищевой «Вишня 667» (растворитель пропиленгликоль – 0,625 мг); вода очищенная;

2,5 мл сиропа содержат 963 мг сахарозаменительного вещества сорбита = 0,080 хлебных единиц.

**Лекарственная форма.** Сироп.

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с запахом вишни сладким фруктовым вкусом, возможно появление легкой опалесценции.

**Название и местонахождение производителя.**

ПАО «Фармак».

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A16\*\*.

Препарат растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который проявляет муколитическое, мукокинетическое, умеренное спазмолитическое действие, обусловленное присутствующими в нем гликозидами (сапонидами). Секретолитический эффект экстракта объясняется действием сапониновых гликозидов, входящих в состав листьев плюща. Спазмолитические свойства его проявляются благодаря парасимпатолитическим эффектам определенных гликозидов, входящих в состав препарата.

Активация  $\beta_2$ -рецепторов в клетках мышц бронхов и эпителия легких стимулирует адренергические эффекты. Это приводит к снижению состава внутриклеточного  $Ca^{2+}$  в мышцах бронхов и расслабления бронхов. Одновременно с этим процессом в результате стимуляции  $\beta_2$ -активности эпителиальные альвеолярные клетки легких II типа продуцируют большее количество сурфактанта. Препарат не приводит к ухудшению центральной регуляции дыхания.

**Показания к применению.**

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.



**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Особые предостережения.**

Препарат содержит сорбит, поэтому не рекомендуется для применения больным с непереносимостью фруктозы.

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Применение в период беременности и кормления грудью не рекомендуется (в связи с недостаточностью клинических данных).

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Не влияет.

**Дети.**

Препарат применяют детям в возрасте от 1 года.

**Способ применения и дозы.**

Препарат применяют внутрь, используя мерную ложечку.

Перед каждым применением сиропа флакон необходимо тщательно встряхнуть.

*Детям от 1 до 6 лет* – по 2,5 мл 3 раза в сутки;

*детям старше 6 лет* – по 5 мл 3 раза в сутки;

*взрослым* – по 5 - 7,5 мл 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения препаратом определяется характером и тяжестью заболевания, однако продолжительность терапии должна составлять не менее 1 недели.

Для получения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжить лечение препаратом еще 2-3 дня после устранения симптомов заболевания. Если улучшение не наступает необходима консультация врача. Общую длительность курса лечения определяет врач.

**Передозировка.**

К нынешнему времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

При применении препарата в дозе, превышающей суточную дозу в 3 раза, могут появиться тошнота, рвота и диарея, что требует немедленного обращения к врачу. Лечение симптоматическое.

**Побочные эффекты.**

Препарат обычно хорошо переносится, но иногда могут развиваться диарея, тошнота, рвота.

При возникновении любых побочных реакций необходимо отменить лечение и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Не известно.

**Срок годности. 2 года.**

После первого вскрытия флакона препарат можно применять в течение 90 дней.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 100 мл во флаконы стеклянные с винтовой горловиной из коричневого стекла, завинченные

КОНТРОЛЬНЫЙ

крышками винтовыми с кольцом контроля раскрытия.  
Каждый флакон вместе с дозирующей ложкой помещают в пачку из картона.

**Категория отпуска.**

Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.** 23.09.2013.

КОНТРОЛЬНЫЙ