

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

23.11.12 № 945

Реєстраційне посвідчення

№ ЦА/4959/04/04

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА
(TINCTURA CAPSICI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настоянки плодів перцю стручкового (Fructus Capsici) (1:10) (екстрагент – етанол 90%) – 50 мл;
допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма. Настойка.

Рідина жовтаво-оранжевого або червонувато-оранжевого кольору. Можливе випадіння осаду.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому і м'язовому болю. Код АТС M02A B.

Препарат чинить місцевопдрозніювальну дію і при нанесенні на шкіру діє подібно до гірчичника.

Показання для застосування. Перцю стручкового настойку застосовувати як місцевий подразнювальний та відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритях, ревматизмі.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість до будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води. Не наносити препарат на місця з гострим запальним процесом шкіри або на ушкоджену шкіру.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність настоянки у період вагітності або годування груддю не вивчались, тому в цей період препарат не слід застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не досліджена.

Діти. Безпечність та ефективність застосування препарату дітям не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не слід призначати.

Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо. Настоянкою розтирати болючі місця 1-2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або легкого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць. Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.

Передозування. Випадки передозування не спостерігалися.

Побічні ефекти. Препарат зазвичай добре переноситься, але в окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості можлива поява алергічних реакцій: відчуття печіння, почервоніння шкіри, свербіж, висипи на місці нанесення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл у флаконах. По 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу