

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
*22.04.09 № 31*  
Регистрационное удостоверение  
№ *UA/1522/02/01*

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

**ПИКОЛАКС**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* sodium picosulfate;

1 таблетка содержит натрия пикосульфата в пересчете на безводное вещество 7,5 мг;

*вспомогательные вещества:* лактоза, моногидрат; крахмал картофельный; повидон; магния стеарат.

**Лекарственная форма.** Таблетки.

Таблетки белого или почти белого цвета, с двояковыпуклой поверхностью.

**Название и местонахождение производителя.**

АО «Стома».

Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.

**Фармакотерапевтическая группа.** Слабительные средства. Контактные слабительные средства. Натрия пикосульфат. Код АТС А06А В08.

Контактное слабительное средство. Активная форма препарата – дифенол, образуется вследствие биотрансформации натрия пикосульфата в толстом кишечнике под влиянием бактериальных сульфотрансфераз. Стимулирует рецепторы слизистой оболочки кишечной стенки, усиливает перистальтику кишечника, ускоряет продвижение содержимого кишечника. Применение препарата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника.

После приема внутрь достигает толстого кишечника без существенной абсорбции и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции. Слабительный эффект развивается через 6 – 12ч после приема. В системном кровотоке и в моче определяется незначительное количество дифенола. Выраженность слабительного эффекта не коррелирует с концентрацией активного дифенола в плазме крови.

**Показания к применению.** Запоры или ситуации, требующие облегчения дефекации.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, обструктивная кишечная непроходимость, боли в животе неустановленного происхождения, тошнота и рвота неясного генеза, острая хирургическая патология органов брюшной полости (острый аппендицит, неспецифический язвенный колит и др.), состояние после операции на желудочно-кишечном тракте, выраженная дегидратация, беременность, период кормления грудью, детский возраст до 10 лет.

**Надлежащие меры безопасности при применении.** Как и другие слабительные средства, Пиколакс не следует принимать ежедневно в течении длительного времени. При ежедневной необходимости приема слабительных средств следует выяснить причину запоров. Длительное

КОНТРОЛЬНИЙ

применение слабительных средств может привести к электролитному дисбалансу и гипокалиемии, а также вызвать привыкание и запоры вследствие эффекта "рикошета".

**Особые предостережения.** Препарат содержит лактозу, что следует иметь в виду лицам с наследственной непереносимостью лактозы.

**Применение в период беременности и кормления грудью.** Применение препарата в период беременности не рекомендовано. В период лечения препаратом кормление грудью необходимо прекратить.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Не влияет.

**Дети.** Применение препарата в этой лекарственной форме не рекомендуется детям в возрасте до 10 лет.

**Способ применения и дозы.** Назначают внутрь взрослым и детям старше 10 лет по 1 таблетке (7,5 мг) вечером перед сном или утром. При тяжелых и стойких запорах взрослым рекомендуется применять по 2 таблетки (15 мг).

Длительность лечения устанавливается индивидуально и обычно не должна превышать 10 дней.

#### **Передозировка.**

**Симптомы.** Кишечная колика, диарея, нарушения водно-электролитного баланса (гипокалиемия, потеря других электролитов и жидкости), мышечная слабость.

**Лечение.** Отмена препарата, промывание желудка, симптоматическая терапия, направленная на нормализацию водно-электролитного баланса и поддержание жизненно важных функций, по показаниям – спазмолитические средства.

**Побочные эффекты.** При длительном применении возможны: боль в животе, диспептические явления, диарея, развитие дегидратации и нарушений электролитного баланса.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

При одновременном применении с диуретиками и глюкокортикоидами повышается риск водно-электролитных нарушений, в частности – гипокалиемии. Возможно ухудшение переносимости сердечных гликозидов. Антибиотики широкого спектра действия могут снизить слабительный эффект натрия пикосульфата.

**Срок годности.** 3 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 10 таблеток в блистере; по 1 или 3 блистера, вложенные в пачку.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

КОНТРОЛЬНИЙ