

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.11.12 № 945
Реєстраційне посвідчення
№ UA/2266/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПУСТИРНИКА ТРАВА
(HERBA LEONURI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: трава пустирника.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина: шматочки стебел, листків та суцвіть, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Порошок крупний: шматочки стебел, листків та суцвіть, подрібнених до розміру 2-3 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M.

Біологічно активні речовини препарату чинять виражені седативні, спазмолітичні, гіпотензивні, кардіотонічні властивості; уповільнюють серцевий ритм, підвищують силу серцевих скорочень, одночасно знижуючи потребу серцевого м'яза у кисні.

Показання для застосування.

Артеріальна гіпертензія легкого ступеня; надмірна нервова збудливість; неврози та неврозоподібні стани (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Артеріальна гіпотензія, брадикардія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати після консультації лікаря, який має оцінити співвідношення користі/ризиків для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

З обережністю слід застосовувати препарат при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механічними засобами через можливе виникнення сонливості або запаморочення.

Діти. Не застосовують дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

4 столові ложки (15 г) трави покласти в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і нагріти в киплячій воді (на водяній бані) протягом 15 хвилин при частому помішуванні, охолодити 45 хвилин при кімнатній температурі, процідити, залишок віджати. Об'єм одержаного настою довести кип'яченою водою до початкового об'єму 200 мл.

Застосовувати внутрішньо за 1 годину до прийому їжі. Дорослим приймати по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу. Дітям від 12 років – по 1/3 склянки 2 рази на добу.

2 фільтр-пакети покласти у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати за вищезазначеною схемою.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від терапевтичного ефекту та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування.

При передозуванні можливі підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення, зниження артеріального тиску. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), кишкові розлади, підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні може посилювати дію етанолу, седативних або снодійних засобів, серцевих глікозидів, анальгетичних, антигіпертензивних препаратів.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дос'є та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу