

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КОРГЛИКОН®
(CORGLYCONUM®)

Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета;

состав: 1 мл раствора содержит коргликона - 0,6 мг;

вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций.

Форма выпуска. Раствор для инъекций.

Фармакологическая группа. Сердечные гликозиды. АТС: С01АХ04**.

Фармакологические свойства. Коргликон® относится к группе сердечных гликозидов и по специфическому эффекту препарат близок к строфантину, но оказывает более длительное действие. Механизм действия Коргликона® связан с воздействием на "Na⁺-K⁺-Насос", транссарколемную систему обмена Na⁺ и Ca²⁺, на циклический аденозинмонофосфат - вторичный медиатор, который участвует в энергетическом обеспечении сократительного процесса миофибрилл.

Фармакокинетика. Эффект препарата, после введения в вену, наблюдается через 3-5 минут, достигая максимума в пределах 30 минут. Препарат не связывается с белками плазмы, не метаболизируется в организме. Экскретирует в неизменном виде, как правило, с мочей. Практически не имеет кумулятивного действия. Период полувыведения из организма (главным образом почками) превышает 28 часа.

Показания к применению. Коргликон® назначают при острой и хронической сердечной недостаточности, сердечной декомпенсации, осложненной тахисистолической формой мерцающей аритмии, для лечения приступов пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.

Способ применения и дозы. Коргликон® вводят внутривенно. Введение осуществляют в течение 5-6 минут в 10 - 20 мл 5% раствора глюкозы 1-2 раза в сутки. Взрослым вводят в разовой дозе 0,5 - 1 мл, детям в возрасте от 2 до 5 лет - по 0,2 - 0,5 мл, от 6 до 12 лет - по 0,5 - 0,75 мл. При введении 2 раза в сутки интервал между инъекциями равен 8-10 часам. Высшие дозы для взрослых в вену: разовая - 1 мл, суточная - 2 мл.

Побочное действие. Могут возникнуть брадикардия, экстрасистолия, бигеминия, диссоциация ритма сердца, нарушение функции проводимости, а также тошнота, рвота, боль в животе, диарея, нарушение цветного зрения.

Противопоказания. Острый миокардит, эндокардит, выраженный кардиосклероз, брадикардия, атриовентрикулярная блокада II - III степени, гипертрофическая кардиомиопатия, нестабильная стенокардия, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, желудочковая тахикардия, тампонада сердца. Возраст ребенка до 2 лет.

Передозировка. При длительном применении возможны брадикардия, полные и неполные блокады проводящей системы сердца, нарушения ритма, что требует назначения препаратов калия, атропина сульфата. В этих случаях необходимо уменьшить дозу и увеличить промежутки между отдельными инъекциями. При резком замедлении пульса инъекции отменяют. Редко наблюдается тошнота, рвота.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Кардиотонический эффект Коргликона® уменьшается при совместном применении с барбитуратами. В сочетании с анаприлином Коргликон® может привести к замедлению предсердно-желудочковой и внутрижелудочковой проводимости. Гипотензивные средства снижают экскрецию Коргликона®, усиливают его токсичность. При сочетании с верапамилом, аденозином, инозином, витаминами группы В, бета-блокаторами, эуфилином токсичность препарата снижается.

Особенности применения. Применение при стенокардии возможно лишь при сердечной недостаточности. Гипокалиемия, гипомагниемия усиливают потенциальную токсичность препарата.

Условия и сроки хранения. Хранят в прохладном, защищенном от света и в недоступном для детей месте. Срок годности - 2 года.

Условия отпуска. По рецепту.

Упаковка. 10 ампул по 1 мл в коробке.

Производитель. Корпорация «Артериум», ОАО «Галичфарм».