

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
08.06.12 № 429
Регистрационное удостоверение
№ УА/6683/01/03

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
САЛИЦИЛОВАЯ МАЗЬ

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: кислота салициловая;
1 г мази содержит салициловой кислоты 20 мг, 50 мг или 100 мг;
вспомогательное вещество: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма. Мазь.

Однородная мазь белого или светло-желтого цвета.

Название и местонахождение производителя. ЧАО Фармацевтическая фабрика "Виола".
Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Кирова, 75.

Фармакотерапевтическая группа. Дерматологические средства. Препараты кислоты салициловой. Код АТС D02A F.

Салициловая кислота при местном применении оказывает слабое антисептическое, а также раздражающее и отвлекающее действие. Подавляет секрецию сальных и потовых желез. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких - кератолитическое действие.

Салициловая мазь применяется наружно, практически не абсорбируется в системный кровоток и не оказывает резорбтивного действия.

Показания к применению. Жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, пиодермия, опрелости, псориаз, дискератоз, ихтиоз, бородавки, мозоли, красный волосяной лишай Девержи.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к салициловой кислоте.

Надлежащие меры безопасности при применении. Не допускать попадания препарата в глаза, не наносить на слизистые оболочки.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Безопасность и клиническая эффективность препарата при беременности и в период кормления грудью не изучались.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описан.

Дети. Опыт применения у детей не описан.

Способ применения и дозы.

Перед наложением повязки с салициловой мазью раны освобождают от некротических

масс, промывают антисептическим раствором.

На пораженную поверхность мазь наносят 2-3 раза в сутки. При псориазе, красном волосяном лишае Девержи, ихтиозе, себорее применяют 2 % мазь, а при выраженном воспалении ее разбавляют вазелином в соотношении 1:2 – 1:4 и применяют 1-2 раза в сутки; после устранения шелушения используют другие средства. Для лечения мозолей и ороговелости кожи применяют 10 % мазь.

На раны мазь наносят стерильной салфеткой или накладывают на раны стерильную повязку, пропитанную мазью. Длительность курса лечения – от 6 до 20 суток.

Передозировка. Мазь предназначена только для наружного применения. При приеме внутрь возникают изжога и боль по ходу пищевода и в желудке, повторная рвота, может быть с примесью крови, иногда - жидкие испражнения с примесью крови. Больные возбужденные, в состоянии эйфории. Появляется головокружение, шум в ушах, ослабление слуха, нарушения зрения. Дыхание шумное, учащенное.

Лечение: промывание желудка через зонд, форсированный диурез, назначение значительного количества щелочной жидкости.

Побочные эффекты. Редко - местные реакции в виде зуда, жжения, кожной сыпи, сухости, шелушения, раздражения, контактного дерматита, крапивницы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом, что требует консультации врача.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. Контейнеры по 25 г.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу