

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: екстракту солодкового кореня густого (Extractum Glycyrrhizae spissum) (3:1) – 4 г на 100 г сиропу;

допоміжні речовини: етанол 96 %, цукор, вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТС R05C A.

Корені солодки голої містять гліциризин, калієву та кальцієву солі гліциризинової кислоти, флавонові глікозиди (ліквіритин, ліквіритигенін, ліквіритозид). Відхаркувальна дія препаратів солодки пов'язана із вмістом гліциризину, який стимулює активність в'язкого епітелію трахеї та бронхів, посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.

Спазмолітична дія препарату на гладкі м'язи дихальних шляхів обумовлена наявністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є ліквіритозид, протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект – наявністю гліциризинової кислоти, яка звільняється при гідролізі гліциризину.

Показання для застосування.

У комплексній терапії інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються утрудненим відходженням мокротиння та кашлем (гострі та хронічні бронхіти, трахеобронхіти, пневмонія, бронхоектатична хвороба).

Як допоміжний засіб при хронічному гіперацидному гастриті.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, цукровий діабет, порушення функції печінки та нирок, артеріальна гіпертензія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Сироп містить цукор, тому препарат не можна застосовувати хворим на цукровий діабет. Вміст спирту в 1 мл – не менше 5 %.



Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності, оскільки солодка гола підвищує рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс. Препарат протипоказаний у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Протягом застосування препарату слід утримуватися від керування автотранспортом та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Дітям віком до 12 років препарат не призначають.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям старше 12 років застосовують по 1 столовій ложці або 3 мірні ложки (15 мл) сиропу після їди 3 - 4 рази на день.

Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

При передозуванні можливе посилення побічних ефектів. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих можуть спостерігатися алергічні реакції (висипання, свербіж, гіперемія та набряки), порушення водно-електролітного балансу (поява набряків).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Сумісне застосування з препаратами, які зумовлюють розвиток гіпокаліємії (тіазидні діуретики, адренкортикостероїди), може призвести до порушення електролітного балансу. Тому не слід протягом тривалого часу застосовувати препарат одночасно з вищевказаними лікарськими засобами.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г у скляних або полімерних флаконах в пачці з мірною ложкою або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

