

СТИМОЛ® (STIMOL)

CITRULLINUM\* A16A A07\*\*

Biocodex

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

р-р д/перорал. прим. 1 г/10 мл пакетик 10 мл, № 18 Цитруллина малат 1 г/10 мл

Прочие ингредиенты: натуральный раствор апельсиновой сангрии, натрия гидроксида раствор концентрированный, вода очищенная.

№ UA/6937/01/01 от 17.08.2007 до 17.08.2012

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Стимол — это комбинация L-цитруллина и малата, которая активизирует механизм образования энергии на клеточном уровне. Малат стимулирует цикл Кребса, включаясь в процесс неоглюкогенеза, снижает уровень лактата в крови и тканях, предотвращая развитие молочнокислого ацидоза и повышает уровень АТФ.

Цитруллин — одна из аминокислот, которая участвует в цикле мочевины, активизирует образование и выведение мочевины из организма. Таким образом, Стимол способствует утилизации лактата, аммиака и образованию энергии, переводя клетку на более высокий энергетический уровень.

Препарат быстро всасывается в кишечнике. После приема 4 г цитруллина малата максимальная концентрация достигается в течение 45 мин и в 6–15 раз превышает исходный уровень в плазме крови. Выводится почками в течение 5–6 ч. Метаболизм Стимола соответствует метаболизму малата и цитрулина.

ПОКАЗАНИЯ:

- симптоматическое лечение функциональной астении;
- физическая астения; психическая астения; постинфекционная астения;
- послеоперационная астения; астения в пожилом возрасте; астения эндокринного происхождения (при сахарном диабете); астения у спортсменов (препарат устраняет боль в мышцах после интенсивных тренировок);
- вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу;
- алкогольно-абстинентный синдром; сексуальная астения.

Общая слабость, эмоциональная лабильность, хроническая усталость, низкая работоспособность, сонливость. Средство показано при мышечной боли и судорогах, обусловленных накоплением лактата после интенсивных физических нагрузок. Рекомендовано в период реконвалесценции при заболеваниях, которые приводят к развитию астеновегетативного синдрома.

ПРИМЕНЕНИЕ:

применять внутрь, предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды или подслащенного напитка. Принимать во время еды.

Взрослым: по 1 пакету 3 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 6 лет: по 1 пакету 2 раза в сутки.

Рекомендуемый курс лечения — 4 нед.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки; детям в возрасте младше 6 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

в отдельных случаях возможно ощущение дискомфорта в эпигастральной области.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

1 пакетик Стимола содержит около 30 мг (1,3 ммоль) натрия, что следует учитывать при назначении препарата больным, находящимся на бессолевой диете. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:**

не установлены.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА:**

не описана.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

при температуре 15–25 °С.