

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
25.10.12 № 834
Реєстраційне посвідчення
№ УEA/2260/09/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МУЧНИЦІ ЛИСТЯ
(UVAE URSI FOLIUM)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: мучниці листя.

Лікарська форма. Листя.

Подрібнена сировина. Шматочки листків різноманітної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 3 мм. Запах відсутній. Сmak сильно-в'яжучий, гіркуватий.

Порошок крупний. Шматочки листків різноманітної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Запах відсутній. Сmak сильно-в'яжучий, гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Рослинні препарати з діуретичним ефектом. Код АТС C03B X.

Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, антисептичну, протизапальну, салуретичну дію. Препарат підвищує діурез, виявляє антибактеріальні властивості за умови лужної реакції сечі.

Показання для застосування.

Запальні захворювання нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів (піеліт, цистит, уретрит), ниркова недостатність з порушенням водного і мінерального обміну – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності. Застосовувати у період годування груддю за призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 5 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв, після чого негайно процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим та дітям від 16 років приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 5-6 разів на добу через 40 хв після їди.

Для дітей відвар готувати з розрахунку 1 чайна ложка листя на 100 мл води. Дітям застосовувати відвар 4 рази на добу через 40 хв після їди: дітям 5-7 років – по 1 чайній ложці; 7-12 років – по 1 десертній ложці; 12-16 років – по 2 десертні ложки.

Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослим та дітям від 16 років приймати у теплому вигляді по 1/4 склянки 4-5 разів на добу через 40 хв після їди. Дітям застосовувати відвар 3 рази на добу через 40 хв після їди: дітям 5-7 років – по 1 десертній ложці; 7-12 років – по 1 столовій ложці; 12-16 років – по 1/4 склянки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз або при тривалому застосуванні може виникнути нудота, блювання, порушення функції нирок, викидні у вагітних. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Забарвлення сечі в темно-зелений колір, алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). Нудота, блювання. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не застосовувати одночасно з лікарськими засобами та їжею, що знижують pH сечі.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C, у недоступному для дітей місці; приготовлений відвар або настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу