УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
28.04.11 № 241
Регистрационное удостоверение
№ UA/2727/02/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

УРОЛЕСАН®
(UROLESAN)

Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 мл препарата содержит пихты масла 67,6 мг, масла мяты перечной 16,9 мг, касторового масла 92,95 мг, моркови дикой плодов экстракта жидкого (1:1) 194,35 мг, хмеля шишек экстракта жидкого (1:1) 278,8 мг, душицы травы экстракта жидкого (1:1) 192,95 мг;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат.

Лекарственная форма. Капли оральные.

Жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом мяты.

Название и местонахождение производителя.
ПАО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в урологии. Код АТС G04B X.

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан® уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.
Уролесан® увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

Показания к применению.
Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (циститы и пиелонефриты); мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления); хронические холециститы (в том числе калькулезные), дискинезии желчных путей, желчекаменная болезнь.

Противопоказания.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Надлежащие меры безопасности при применении.
Не применять препарат в случае, если диаметр конкрементов превышает 3 мм.

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.

Опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не изучалась.
Дети.
При необходимости применения детям в возрасте до 7 лет рекомендуется Уролесан® сироп.

Способ применения и дозы.
Препарат принимают внутрь перед едой.
Рекомендованная доза для взрослых: по 8-10 капель (на сахар, для пациентов с сахарным диабетом - на хлеб) 3 раза в сутки. Продолжительность приема составляет 5-30 дней. При необходимости возможны повторные курсы. При почечных и печеночных коликах разовая доза составляет 15-20 капель.
Рекомендованная доза для детей 7-14 лет: по 5-6 капель (на сахар, для пациентов с сахарным диабетом - на хлеб) 3 раза в сутки.
Разовую дозу, частоту и длительность лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.
При передозировке возможны: тошнота, рвота, боль в животе, головокружение.
Лечение: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Побочные эффекты.
В отдельных случаях при применении препарата возможны:
- *со стороны пищеварительного тракта*: диспептические явления (тошнота, рвота, диарея, боль в животе);
- *аллергические реакции*: чувство зуда, покраснение лица, кожная сыпь, ангионевротический отек (чувство першения в горле, затруднение дыхания, отек лица, языка);
-*со стороны центральной и периферической нервной системы*: головокружение, общая слабость;
- *со стороны сердечно-сосудистой системы*: артериальная гипертензия, гипотензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не изучалось.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения.
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакона срок годности препарата при соблюдении условий хранения не изменяется. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.
По 25 мл во флаконе-капельнице, по 1 флакону-капельнице в пачке; по 25 мл во флаконе-капельнице, закрытом крышкой с контролем первого вскрытия, по 1 флакону-капельнице в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.