

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

УРОЛЕСАН®

Состав лекарственного средства.

Действующие вещества: 1 мл сиропа содержит пихты масла 4,19 мг, мяты перечной масла 1,05 мг, моркови дикой плодов экстракта жидкого 12,04 мг, хмеля шишек экстракта жидкого 17,26 мг, душицы травы экстракта жидкого 11,95 мг;

вспомогательные вещества: полисорбат-80, кислоты лимонной моногидрат, кислота сорбиновая, сироп сахарный, динатрия эдетат, вода очищенная.

Лекарственная форма. Сироп.

Жидкость светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом. Допускается опалесценция.

Название и местонахождение производителя. АО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в урологии. Код АТС G04B D10.

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан® уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.

Уролесан® увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 минут и продолжается 4-5 ч. Максимальный эффект наступает через 1-2 ч. Выводится через пищеварительный тракт и почками.

Показания к применению. Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (циститы и пиелонефриты); мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления); хронические холециститы (в том числе калькулезные), дискинезии желчных путей, желчекаменная болезнь.

Противопоказания.

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в крови необходимо быть осторожными, применяя Уролесан® (в состав препарата входит сахарный сироп).

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или лактации не изучалось.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Нет сообщений.

Дети. Препарат не применяется в детском возрасте до 1 года.

Способ применения и дозы. Препарат принимают внутрь до еды.

Рекомендуемые дозы для взрослых: по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки. При острых состояниях (в т.ч. при почечной и печеночной коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях – от 7 дней до 1 месяца. При возникновении почечной и печеночной колик разовую дозу можно однократно повысить до 2 чайных ложек (10 мл), затем на последующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл).

Рекомендуемые дозы для детей: 1-2 года – по 1-2 мл 3 раза в сутки; 2-7 лет – по 2-4 мл 3 раза в сутки; 7-14 лет – по 4-5 мл 3 раза в сутки. Дозировка проводится с помощью шприца-дозатора.

Передозировка. При передозировке возможны: тошнота, головокружение.

Лечение: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Побочные эффекты. Обычно Уролесан® хорошо переносится. В отдельных случаях при применении препарата возможны:

- со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления (тошнота, рвота);
- аллергические реакции: чувство зуда, покраснение лица, кожная сыпь, ангионевротический отек (чувство першения в горле, затруднение дыхания, отек лица, языка);
- со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, гипотензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Не изучалось.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре от 8 °С до 15 °С. После вскрытия хранить не более 28 суток при температуре от 8 °С до 15 °С.

Упаковка. По 90 мл в банке или флаконе стеклянных; по 180 мл во флаконах стеклянных, вложенных в пачку вместе с дозатором.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.