

**Инструкция  
по медицинскому применению  
НИТРОФУНГИН**

**Регистрационный номер:****Торговое название препарата:** НИТРОФУНГИН**Международное непатентованное название или группировочное название:**

Хлорнитрофенол

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения**Состав:**

Активное вещество: хлорнитрофенол – 1,0 г.

Вспомогательные вещества: этанол 96 %, триэтиленгликоль, вода очищенная – до 100 мл.

**Описание**

Прозрачный, от желтого до зелено-желтого цвета раствор с запахом спирта.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогрибковое средство**Код АТХ:** D01AE**Фармакологические свойства**

Противогрибковое средство. При концентрации раствора 0,0001% подавляет рост *Microsporum canis*, *Trichophyton gypseum*; при концентрации 0,0007% подавляет рост *Candida albicans*; при повышении содержания активного вещества до 0,003% проявляет фунгицидное действие.

При более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

**Показания к применению**

Грибковые поражения кожи: руброфития, паховая эпидермофития, трихофития кандидоз кожи, микозы стоп, грибковые заболевания наружного слухового прохода.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Беременность и период лактации**

Применение при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Раствор наносят на пораженные участки кожи ватным тампоном 2-3 раза в сутки. Лечение продолжают до исчезновения клинических проявлений заболевания. Для предупреждения рецидива раствор продолжают применять 2-3 раза в неделю в течение 4-6 недель. С целью профилактики раствор применяют 1-2 раза в неделю в течение 4 недель.

**Побочное действие**

Местнораздражающее действие, фотодерматит, аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Неизвестно.

**Особые указания**

В случае выраженного раздражающего действия при ежедневном применении можно использовать раствор разбавленный водой (1:1). Участки кожи, обработанные препаратом не следует подвергать воздействию солнечных лучей.

**Форма выпуска**

Раствор для наружного применения 1 %. По 25 мл препарата во флакон коричневого стекла, снабженный капельницей и крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

При температуре от 10°C до 25°C, в защищенном от света месте.

В недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

АЙВЭКС Фармасьютикалс с.р.о., Чешская Республика  
Опава 9, Оставска 29, 74770

Претензии потребителей направлять в адрес представительства:

107031, г. Москва, Дмитровский пер., д.9.

тел. +7 (495) 234-97-13, факс +7 (495) 234-97-11

Директор ИДКЭЛС

Представитель фирмы



С.В. Буданов



О.А. Иванова