

ЗАТВЕРЖДЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
25.04.13 № 343
Реєстраційне посвідчення
№ УА/2476/09/09

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР**

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 110 г збору містять: цмину піщаного квітки (*Helichrysi arenarii flos*) 40 г, бобівника трилистого листя (*Menyanthidis trifoliatae folium*) 30 г, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folium*) 20 г, коріандру плодів (*Coriandri fructus*) 20 г.

Лікарська форма. Збір.

Подрібнена сировина: суміш жовтих кулеподібних квіткових кошиків цмину піщаного, зелених шматочків листів бобівника трилистого та м'яти перцевої (вказані види сировини подрібнені до розміру часток приблизно 5 мм) та жовтувато-бурих плодів коріандру. Запах приемний, смак водної витяжки гіркий, пряний, який трохи охолоджує.

Порошок крупний: суміш шматочків жовтих квіткових кошиків цмину піщаного, зелених шматочків листя бобівника трилистого та м'яти перцевої та жовтувато-бурих плодів коріандру (всі вказані види сировини подрібнені до розміру часток приблизно 2 мм). Запах приемний, смак водної витяжки гіркий, пряний, який трохи охолоджує.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ «Фармацевтична фабрика «Віола». Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Жовчогінний засіб. Код АТС A05A X.

Водна витяжка зі збору має жовчогінний ефект. Препарат сприяє підвищенню жовчної секреції, змінює хімічний склад жовчі (зменшує концентрацію жовчних кислот, підвищує вміст холатів і білірубіну в жовчі), збільшує жовчовиділення, чинить протизапальну, антибактеріальну і спазмолітичну дію, стимулює секреторну функцію шлунка і підшлункової залози, підвищує діурез, діє як кровоспинний засіб.

Показання для застосування. У складі комплексної терапії хронічного холециститу, холангіту.

Протипоказання. Обтураційна жовтяниця. Гіперчутливість до компонентів препарату та до рослин родини Айстрових (Складноцвітні). Жовчнокам'яна хвороба; гострі запальні захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози; бронхіальна астма.

Належні заходи безпеки при застосуванні. З обережністю застосовувати хворим зі шлунково-стравохідним рефлюксом, печією.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не досліджена.

Діти. Безпека та ефективність застосування препарату для дітей не встановлені. Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози. Для приготування настою 1 столову ложку збору покласти в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) холодної кип'яченого води, закрити кришкою, нагріти у киплячій воді (на водяній бані) 15 хв, настояти при кімнатній температурі 45 хв, процідити. Сировину, що залишилася, віджати до процідженого настою. Об'єм останнього довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати внутрішньо дорослим та дітям старше 12 років за 30 хв до їди по 1/2-1/3 склянки 3 рази на добу.

2 фільтр-пакети покласти у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настояти 15 хв. Приймати внутрішньо за 30 хв до їди, по 1/2-1/3 склянки 3 рази на добу. Максимальна курсова доза визначається лікарем. Максимальна добова доза 1,5 склянки настою.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

Передозування. Можливе підвищення артеріального тиску, біль у ділянці серця.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, крапив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлені.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу